

PESTISEN C

Živa , stenuirana virusna vakcina protiv klasične kuge svinja

SASTAV:

Liofilizirana vakcina sadržava atenuirani virus klasične kuge svinja Soj C umnožen u tkivnoj kulturi svinjskih bubrega. Jedna doza vakcine (2 ml) sadrži najmanje 100 PD₅₀ , a najviše 10 000 PD₅₀ za svinje. Diluent E je mješavina natrij hlorida, kalij hlorida, natrij hidrogenkarbonata, magnezij sulfata, natrij hidrogen fosfata, glukoza monohidrata, fenol reda i vode za injekcije.

DJELOVANJE:

U vakciniranih svinja vakcina potiče stvaranje specifičnih antitijela a time i specifičnu zaštitu protiv infekcije svinjskim pestivirusom.

INDIKACIJE: Vakcina je namjenjena kako za profilaktičku vakcinaciju tako i za urgentno vakcinisanje svinja protiv svinjske kuge. Vakcinišu se sve svinje od najmanje starosne dobi 7-14 dana. U slučaju masovne urgentne vakcinacije, vakcinu je moguće koristiti i za vakcinisanje gravidnih životinja.

NEŽELJENI EFEKTI: Rijetko se može pojaviti opća anafilaktička reakcija koja se uoči u periodu od 2 sata nakon primjene vakcine. U tom slučaju potrebno je odmah upotrijebiti antihistaminske preparate.

APLIKACIJE I DOZE:

Doza vakcine (2ml) se aplicira intramuskularno. Pred aplikaciju liofilizat se rekonstituiše sa 2 ml diluenta E a zitm se taj sadržaj vrati u bocu sa preostalim diluentom E, nakon čega je vakcina spremna za upotrebu. Put i interval aplikacije su slijedeći:

Vakcinacija

- a) prasad od nevakcinisanih krmača vakciniše se u dobi od 7 do 14 dana
- b) prasad od vakcinisanih krmača u dobi od 7 do 8 sedmica
- c) neposredno ugrožena prasad u dobi iznad 4 sedmice
- d) gravidne svinje mogu se vakcinisati samo u nuždi

Revakcinacija

- a) odbijena prasad namjenjena uzgoju se revakcinira 2 mjeseca kasnije
- b) mlade krmače se revakciniraju 1 mjesec prije parenja
- c) rasplodne svinje se revakciniraju svake druge godine ili jednom godišnje

KONTRAINDIKACIJE:

Kada se vakcina primjenjuje u skladu sa uputama nema kontraindikacija. Oboljele svinje ne smiju biti vakcinirane.

NAPOMENA:

-Pošto se radi o živoj virusnoj vakcini, ne smije doći u kontakt sa očima ljudi.

-Nakon vakcinacije neophodno je oprati i dezinficirati ruke.

-Prazne i neiskorištene bočice sa vakcinom moraju se tretirati spaljivanjem, autoklaviranjem ili uranjanjem u dezinficijens i potom uklonjene.

KARENCIJA:

Nije potrebna

ČUVANJE:

Vakcinu čuvati na tamnom i suhom mjestu na temperaturi između 2 do 8°C. Nakon rekonstitucije vakcinu upotrijebiti u roku od 2 sata. Vakcinu držati van dohvata djece.

ROK UPOTREBE:

Pod propisanim uvjetima čuvanja dvije godine od datuma proizvodnje.

NAČIN IZDAVANJA:

Vakcina se izdaje na veterinarski recept.

PAKOVANJE:

Kutija sa 20 bočica po 50 doza vakcine i 20 bočica po 100 ml diluenta.

BROJ I DATUM RJEŠENJA: UP-I 06-2-24/17-977/11 od 15.07.2011

PROIZVOĐAČ: BIOVETA , a.s., Komenskeho 212, 68323 Ivanovice na Hane, Czech Republic

ZASTUPNIK: BOSNA VET doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica