

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PINOX 1250mg
comprettae spumescences
oblete za intrauterinu primjenu

Jedna kompreta/obleta sadrži:

Aktivna supstanca:

Oxytetracyclin hydrochloride 1250,0 mg

Pomoćna sredstva:

Sodium bikarbonat (Natrii hydrogencarbonas)

Cellulose microcrystalline

Limunska kiselina (Acidum citricum anhydricum)

Magnezium stearat (Magnesii stearas)

Sodium laurylsulphate (Natrii laurilsulfas)

Indikacije:

Lijek je namijenjen za intrauterino liječenje akutnog puerperalnog endometritisa, zaostajanja posteljice (*retentio secundinarum*), fetomije, porođaja carskim rezom, kao i kod prevencije inflamatornih procesa (endometritis i piometra) odmah nakon porođaja prouzrokovanog mikroorganizmima osjetljivim na oksitetraciklin.

Oksitetraciklin ima bakteriostatički učinak koji se manifestuje inhibiranjem proteinske sinteze u ribozomima bakterija. Djeluje na Gram negativne mikroorganizme (*Enterobacterium spp*, *Pasteurella spp*, *Bordetella spp*, *Hamophilus spp*, *Moraxiella spp*, *Branhamella spp*, *Brucella spp* i td), Gran pozitivne (aerobni cocci, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Listeria spp* i td), sporulirajuće anaerobe, ali i one koji ne sporuliraju (*Clostridium spp*, neke vrste *Bacteroides spp*, *Fusobacterium necrophorum*, *Peptostreptococcus spp.*), kao i mikoplazme, rikecije i hlamidije. Lijek ima i antiprotozoarno djelovanje, ali nema učinka na *Pseudomonas aeruginosa* i većinu vrsta iz grupe *Proteus spp*, *Providentia spp*, *Morganella spp*, i neke vrste *Bacteroides spp.*"

Kontraindikacije:

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na aktivnu supstancu ili druge tetracikline.

Neželjene reakcije:

Nisu poznate

Rizik od sporednih efekata je neznan zbog specifične metode administracije (intrauterina) i sigurnosnog profila proizvoda.

Ciljane vrste:

(goveda) krave, (konji) kobile, magarice, ovce, koze i (svinje) krmače.

Doziranje za svaku vrstu, način i metode administracije:

Koristi se u intrauterinim prenosom kroz cerviks.

Doziranje za liječenje:

Krave, kobile, magarice: 1-2 komprete/ oblete svaka 24 sata tokom 3-5 dana.

Ovce, koze, svinje: 1 kompreta/ obleta svaka 24 sata tokom 3-5 dana.

Doziranje kao prevencija:

Krave, kobile, magarice: 1-2 komprete

Ovce, koze, svinje: 1 kompreta

Profilaktični tretman bi trebao biti izvršen odmah nakon porođaja i ponovljen ako je potrebno nakon 24 sata. U slučaju septikemije i generalne infekcije, uporedo sa kompretama/ obletama trebalo bi prepisati i odgovarajući tretman putem sistemskog uvođenja odgovarajućih antiupalnih sredstava.

Savjet o ispravnoj administraciji:

Koristi se intrauterino prenosno kroz cervix. U slučaju suhoće uterusa 300ml izotoničnog rastvora NaCl zagrijanog na 38°C bi trebalo unijeti zajedno sa apliciranom kompretom/ obletom.

Karenca:

Goveda (krave), konji (kobile, magarice), ovce, koze, svinje (krmače)

Meso i iznutrice (za ljudsku ishranu) najmanje 60 sati nakon posljednjeg tretmana

Mlijeko (za ljudsku ishranu) najmanje 72 sata (6 muža) od posljednjeg tretmana

Meso životinja koje su uginule ili su hitno zaklane tokom tretmana ne bi trebalo koristiti za ljudsku ishranu.

Nije dozvoljeno korištenje mlijeka tokom terapije najmanje 72 sata nakon tretmana kod mliječnih životinja koje proizvode mlijeko za ljudsku ishranu.

Specijalna upozorenja za skladištenje:

Držati dalje od dosega djece. Čuvati na temperaturi do 25°C

Čuvati u originalnom pakovanju. Zaštititi od direktnih sunčevih zraka.

Ne koristiti nakon isteka roka trajanja naznačenog na pakiranju.

Čuvati na suhom mjestu.

Specijalna upozorenja:

Specijalna upozorenja za svaku ciljanu životinju

Nema ih.

Specijalne mjere opreza za korištenje na životinjama

Korištenje ovog preparata treba biti u skladu sa zahtjevima nadležnih i lokalnih propisa za upotrebu antibiotika.

Neplanirana zloupotreba proizvoda kao i nekontrolisano korištenje kada se ne slijede instrukcije navedene u sažetku karakteristika proizvoda mogu dovesti do povećane bakterijske otpornosti na tetracikline i stoga smanjiti efikasnost tretmana liječenja. Ukoliko je potrebno koristiti lubrikant posebno kod malih preživara / ovaca i koza/ i svinje. Koristiti u slučajevima otvorenosti cervixa.

Specijalna upozorenja koja trebaju poštovati osobe koje administriraju veterinarski proizvod životinjama: Osobe sa poznatom osjetljivošću na oxytetracikline trebaju izbjegavati kontakt sa veterinarsko medicinskim proizvodom. Zaštitna oprema koja se sastoji od hirurških rukavica bi trebala da se koristi prilikom upotrebe veterinarsko medicinskog proizvoda. Oprati ruke nakon administracije proizvoda. Ne jesti, piti ili pušiti prilikom davanja proizvoda.

Koristenje tokom graviditeta, laktacije

Gravidnost: proizvod se može koristiti tokom cijelog perioda graviditeta.

Laktacija: nije dozvoljeno korištenje kod mliječnih životinja čije je mlijeko namijenjeno za ljudsku ishranu.

Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugim oblicima interakcije:

Davanje oxytetraciklina može dovesti do pojave dvovalentnih ili trovalentnih kationa koji mogu smanjiti absorpciju tetraciklina ili drugih lijekova u prisustvu ovih kationa.

Predoziranje (simptomi, postupci u slučaju nepredviđenih situacija, protuotrovi) u slučaju potrebe

Rizik od predoziranja je zanemariv zbog specifičnog metoda davanja (intrauterina) i sigurnosnog profila proizvoda.

Inkompatibilnost

Nije poznata

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal, ako ih ima:

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon u opravljaju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Pinox 1250mg komprete/ oblete ne bi trebalo odlagati u vodotokovima jer može biti opasno za ribe i druge vodene organizme.

Pinox 1250mg komprete/ oblete ne bi trebalo odlagati sa vodom za domaćinstva.

Pitajte svog veterinara kako odlagati proizvod koji više nije u upotrebi. Ove mjere bi trebale pomoći zaštiti okoliša.

Pakovanje:

Plastični kontejner hermetički zatvoren sa trakastom termofolijom i plastičnim zatvaračem sadrži 40 aluminijskih folijskih blistera koji sadrži 1 kompretu (obletu)

Način izdavanja: na recept

Proizvođač:

Golashpharma Ltd Bulgaria , Sapareva Bana, ul.Pobeda 33, obl.Konstendil, Bugarska.

tel:+359 888 300 755

Uvoznik za BiH:

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica , Bosna i Hercegovina

tel: 032/423-196; fax: 032/423-194

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-24/17-957/15 J.B. od 26.10.2015.