



Poulvac Bursine 2

SASTAV

1 doza cjeviva sadrži

Aktivna tvar:

Atenuirani soj virusa Gumboro bolesti minimum $3,1 \log^{10} \text{TCID}_{50}$

Pomopćne tvari:

Saharoza

Natriumove soli glutaminske kiseline

Kalijeve soli glutaminske kiseline

Gentamicin

Sterilna vodena otopina

INDIKACIJA

Za aktivnu imunizaciju pilića protiv zaraznog virusa bursitis (Gamboro) kako bi se smanjila znakove uzrokovanih infekcijom.

APLIKACIJA I DOZE

Davati s vodom za piće.

Jedna doza za piliće u 7 do 28 dana starosti.

Drugo cijepjenje bi trebalo primijeniti od 7 do 10 dana nakon prvog cijepjenja.

Brojleri: Cijepjenje se može izvesti od jednog dana starosti pomoću spreja ili vode za piće.

Nipple sistem pijeljnja vode nije prikladan za piliće stare 1-3 dana.

1000 doza cjeviva razrijediti u 1L hladne i svježje vode što bi bilo dovoljno za 1000 kokoši, a u 10 L hladne i svježje vode za 1000 od 10 dana starih pilića.

1000 doza u 1L vode na sobnoj temperaturi prskati putem raspršivača 15-20 sekundi. Držati ih u kutijama 30-45 minuta. Iskorištenost vakcine je 500/750 ml s uspjehom. Držati ih bez propuha.

KONTRAINDIKACIJE

Nema

POSEBNE MJERE OPREZA

Korištenja materijala čista cijepjenja.

Spriječiti cjepivo od izlaganja toplini i / ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Kontakt s dezinficijensima čini cjepivo neučinkovitim.

NUSPOJAVE

Nema

KARENCA

0 dana

NAČIN ČUVANJA

Na hladnom i tamnom mjestu između 2-8°C

ROK UPOTREBE

Otisnut je na ambalaži

Nakon otvaranja koristiti odmah.

NAČIN IZDAVANJA

Na veterinarski recept

PAKOVANJE

1000, 2500, 5000 ili 10.000 doza

Sve doze ne moraju biti prisutne na tržištu.

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-713-1/13 od 10.05.2013. godine

PROIZVOĐAČ

FORT DODGE A.H., USA

ZASTUPNIK

Pfizer BH d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, BiH