

PROMEKTINE
injekciona solucija
ZA UPOTREBU U VETERINARSTVU

Injekciona solucija

Sastav:

1 ml injekcione solucije sadrži:
Ivermektin 10 mg
Benzil alkohol 23.2 mg

Indikacije:

Goveda:

Tretman slijedećih unutrašnjih i vanjskih parazita.

- Želudačno-crijevni nematodi (odrasli oblici i larveni oblici IV stadijum): *Ostertagia ostertagi* (uključujući inhibisane oblike), *O.lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *T.colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *C.Punctata*, *C.pectinata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Bonostomum phlebotomum* (odrasli oblici), *Nematodirus helvetianus* (odrasli oblici), *N.spathiger* (odrasli oblici)
- Plućni nematodi: *Dictyocaulus viviparus* (odrasli i larve L4)
- Štrkljevi (sva tri parazitska stadijuma): *Hypoderma bovis*, *H.lineatum*
- Uši: *Lignonathus vituli*, *Haematopinus eurytarnus*, *Solenopotes capillatus*.
- Šugarci: *Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes ovis* (var.bovis)

Ovce:

Tretman slijedećih unutrašnjih i vanjskih parazita

- Želudačno-crijevni nematodi (odrasli i nezreli oblici): *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *O.trifurcata*, *Trichostrongylus axei* (odrasli oblici), *T.vitrinus* (odrasli oblici), *T.colubriformis*, *Nematodirus fillicolis*, *Cooperia curticei*, *Oesophagostomum colombianum*, *O.venulosum*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis* (odrasli oblici)
- Plućni nematodi (odrasli i nezreli oblici): *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylus rufescens*.
- Nazalni štrkljevi: *Oestrus ovis* (svi larveni oblici)
- Šugarci: *Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes communis* (var.ovis)

Svinje:

Tretman slijedećih unutrašnjih i vanjskih parazita.

- Želudačno-crijevni nematodi (odrasli oblici i larveni oblici IV stadijum): *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum ransonii* (odrasli oblici)
- Plućni nematodi: *Metastrongylus spp.* (odrasli oblici)
- Uši: *Haematopinus suis*
- Šugarci: *Sarcoptes scabiei* (var.suis)

Kontraindikacije:

Nisu poznate

Neželjena dejstva:

Kod nekih životinja može biti uočljiv bol i inflamatorne reakcije na ubodnoj strani. Ove reakcije prolaze bez liječenja.

Ukoliko uočite ozbiljne učinke koji nisu navedeni u ovom uputstvu , molimo da obavijestite vašeg veterinara.

Ciljane vrste životinja: Goveda , svinje, ovce

Doziranje i način primjene:

Subkutano.

Goveda i ovce: jednokratno, subkutano. 1ml Promectina na 50kg tjelesne mase (ekvivalent 0.2mg ivermectina na 1kg tjelesne mase)

Svinje: jednokratno, subkutano. 1.5ml Promectina na 50kg tjelesne mase (ekvivalent 0.3mg ivermectina na kg tjelesne mase)

Kod goveda i ovaca lijek se aplicira pod kožu ispred ili iza lopatice.

Kod svinja lijek aplicirati pod kožu u predjelu vrata, odmah iza uha.

Uputstvo za pravilnu upotrebu lijeka

Lijek se daje subkutano.

Ne smije se davati intravenski i intramuskularno.

Koristiti sterilan pribor.

Da bi se odredila ispravna doza prethodno treba odrediti težinu životinje.

Doze veće od 10ml rasporediti na dva ubodna mjesta da bi se izbjegle lokalne reakcije .

Karenca:

Meso i iznutrice:

Goveda - 49 dana

Svinje i ovce: 28 dana

Mlijeko: Nije za upotrebu kod životinja čije se mlijeko koristi za ljudsku upotrebu.

Ne koristiti kod gravidnih životinja namjenjenih za proizvodnju mlijeka za ljudsku upotrebu 2 mjeseca pred očekivani partus.

Posebna upozorenja

Posebna upozorenja za upotrebu za svaku ciljanu vrstu:

Ne smije se davati intravenski i intramuskularno.

Ivermektin nije tolerantan za neke vrste životinja za koje ovaj lijek nije autoriziran (nekoliko slučajeva intolerancije viđeno je sa smrtnim ishodom kod pasa, posebno colli rase, engleskog ovčara, i druge slične vrste, njihovi križanaca, kao i kornjače)

Ne koristiti kod poznate osjetljivosti na aktivne substance.

Posebna upozorenja za primenu na životinjama:

Kod aplikacije koristiti sterilan pribor i dezinfikovati mjesto davanja, da bi se smanjio rizik od klostridijalne infekcije. U slučaju infekcije životinju liječiti odgovarajućim antibiotikom.

Preporučuje se da tretirane životinje prethodno budu vakcinisane protiv ovih infekcija.

Trebalo bi izbjeći kontakt između tretiranog i netretiranog inficiranog stada i između ne inficiranog stada najmanje 7 dana nakon posljednjeg tretmana.

Doze veće od 10 ml podijeliti između dva mjesta ubrizgavanja da se smanje povremene lokalne reakcije.

Promectin je efikasan protiv svih stadijuma goveđeg štrklja. Za najbolje rezultate, goveda treba liječiti odmah nakon završetka sezone muha. Uništavanje *Hypoderma larvi* (goveđeg štrklja) u periodu kada su ove larve u vitalnim dijelovima organizma, može izazvati neželjene domaćin-parazita reakcije. Ubijanje *Hypoderma lineatum* kada se nalaze u tkivu oko ezofagusa može izazvati salivaciju i nadun. Ubijanje *Hypoderma bovis* kada se nalaze u kičmenom kanalu može izazvati teturanje ili paralizu. Goveda bi trebala biti liječena prije ili poslije navedenih stadija razvitka larvi. Goveda tretirana sa Promectinom nakon završetka sezone muha, mogu se ponovo liječiti tokom zime za unutrašnje parazite, šugarce ili uši bez opasnosti od mogućih reakcija vezanih za larve.

Česta upotreba i ponovljeno korištenje ivermectina može uzrokovati rezistenciju.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lijek životinjama

Izbjegavati pušenje i konzumiranje pića prilikom upotrebe sa proizvodom.

Oprati ruke nakon upotrebe.

U slučaju samoinjiciranja javiti se ljekaru sa bočicom, kutijom ili naljepnicom proizvoda.

Rukovanje treba izbjeci ukoliko se pri korištenju dolazi u kontakt sa očima, sluznicom, ranama, ili inflamatornom kožom . U slučaju kontakta preporučuje se ispiranje ovih područja sa mlazom vode.

Gravidnost i laktacija:

U preporučenim dozama korištenja nije primjećen uticaj na fertilnost ili gravidnost.

Nije namjenjen za korištenje kod životinja u laktaciji za proizvodnju mlijeka za ljudsku upotrebu. Ne koristiti kod gravidnih životinja koje se koriste za proizvodnju mlijeka za ljudsku upotrebu 2 mjeseca prije očekivanog partusa.

Predoziranje:

Kod goveda, ataksija i depresija se javlja kod subkutane administracije pojedinačne doza od 4,0 mg ivermektina po kg .

Kod svinja, doza 30mg ivermektina po kg (100x preporučena doza) data subkutano uzrokuje letargiju, ataksiju, bilateralnu midrijazu, naizmjenične tremore, otežano disanje i ležanje na strani.

Provesti simptomatski tretman u slučaju problema predoziranja.

Posebna upozorenja za čuvanje lijeka

Držati van domašaja djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C

Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotrebe: 3 godine

Ne koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja naznačenog na pakovanju

Rok upotrebe nakon otvaranja pakovanja: 28 dana.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Lijekove ne bi trebalo odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Ove mjere služe u svrhu pomoći zaštite okoliša.

Pakovanje: bočice od 50, 100, 200, 250, 500 ml

Način izdavanja: Izdaje se na veterinarski recept

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-24/17-920/17 J.B, od 01. novembra 2017. godine

Proizvođač: Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona Spanija

Uvoznik i distributer za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a 72000 Zenica
tel: 032/423-196, fax: 032/423-194