

Purevax RCP

liofilizat i otapalo za suspenziju za injekcije.

Po dozi od 1 ml:

Liofilizat :

Atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačaka (soj FHV F2) $\geq 10^{4.9}$ CCID₅₀¹

Inaktivirani antigeni kalici virusa mačaka (soj FCV 431 i FCV G1) ≥ 2.0 ELISA U.

Atenuirani virus panleukopenije mačaka (PLI IV) $\geq 10^{3.5}$ CCID₅₀¹

Pomoćna tvar:

Gentamicin, najviše 16,5 µg

Otapalo:

Voda za injekcije q.s. 1 ml

¹: količina virusa koja zarazi 50 posto stanica kulture u koju je dodan virus

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija mačaka starih 8 tjedana i starijih:

- protiv virusnog rinotraheitisa mačaka za smanjenje kliničkih znakova,
- protiv infekcije kalici virusom za smanjenje kliničkih znakova i izlučivanja,
- protiv panleukopenije mačaka za sprječavanje smrtnosti i kliničkih znakova.

Pokazalo se da imunitet nastupa 1 tjedan nakon prvog cijepljenja protiv komponenti rinotraheitisa, kalici virusa i panleukopenije.

Trajnost imuniteta je 1 godinu nakon zadnje (re-)vakcinacije protiv rinotraheitisa, kalici virusa i 3 godine protiv komponente panleukopenije.

KONTRAINDIKACIJE

Ne smije se cijepiti gravidne mačke. [Ne preporuča se primjena tijekom laktacije.](#)

NUSPOJAVE

U normalnim uvjetima upotrebe, povremeno se mogu javiti apatija i anoreksija, kao i hipertermija (u trajanju obično 1 ili 2 dana). Može se javiti i lokalna reakcija (lagana palpacijska bolnost, svrbež ili ograničen otok) koja nestaje za najviše 1 ili 2 tjedna.

U izuzetnim okolnostima može se javiti hipersenzibilna reakcija, koja može zahtijevati odgovarajući simptomatski tretman.

Ako zamijetite ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo da se javite veterinaru.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Nakon rekonstitucije liofilizata otapalom injicirajte supkutano jednu dozu (1 ml) cjepiva, prema slijedećem rasporedu cijepljenja:

Prvo cijepljenje:

- Prva injekcija: od 8 tjedana starosti,
- druga injekcija: 3 do 4 tjedna kasnije.

Kada se očekuje prisutnost visoke razine majčinih antitijela protiv komponenti R, C ili P (npr. kod mačića u dobi 9-12 tjedana porijeklom od mačaka cijepljenih prije trudnoće i/ili s poznatim ili suspektim prethodnim izlaganjem patogenima, prvo cijepljenje treba odgoditi do dobi od 12 tjedana.

Docijepljivanje:

- za sve komponente jedna godina nakon prvog cijepljenja,
- nakon toga svake godine za rinotraheitis i kalici virus, a svake tri godine za panleukopeniju.

SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Upotrijebiti odmah nakon rekonstitucije. Podaci o neškodljivosti i djelotvornosti su dostupni, što je dokaz da ovo cjepivo smije biti pomiješano i primijenjeno s neadjuviranim cjepivom protiv mačke

leukemije tvrtke Merial i/ili primijenjeno istog dana ali ne pomiješano s adjuviranim cjepivom protiv bjesnoće tvrtke Merial.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

Čuvati i prevoziti rashlađeno (2 °C – 8 °C).

Zaštiti od svjetla.

Ne zamrzavati.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Upotrijebiti samo na zdravim životinjama.

U slučaju nehotičnog samo-injiciranja, odmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP ili naljepnicu.

Ne smije se cijepiti gravidne mačke.

Upotreba se ne preporučuje tijekom laktacije.

Nisu primijećene nikakve druge nuspojave osim onih spomenutih u odjeljku “Nuspojave” nakon primjene nekoliko doza, te hipertermije koja može izuzetno trajati 5 dana.

OSTALE INFORMACIJE

Pakiranje sadrži 10 bočica s po 1 dozom liofilizata i 10 bočica s 1 ml otapala

Pakiranje sadrži 50 bočica s po 1 dozom liofilizata i 50 bočica s 1 ml otapala

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu

Može se izdavati samo na veterinarski recept.