

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

PREDMET: Prijedlog „Upustva proizvoda“ za primjenu na teritoriji BiH:

REPEN

Injekcioni rastvor

SASTAV 1 ml rastvora sadrži:

Benzilpenicilin procain	200.000 u
Dihidrostreptomycin sulfat	250 mg

ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA

Goveda, svinje, ovce, koze, konji, psi i mačke.

DJELOVANJE

Repen je kombinacija benzil penicillin G procaina i dihidrostreptomycin sulfata u vodenom rastvoru spremnom za upotrebu. Ova kombinacija omogućava njegovo produženo antibakterijsko djelovanje protiv infekcija uzrokovanih mješovitom bakterijskom florom.

Benzilpenicilin procain djeluje baktericidno i negativno utječe na razmnožavanje bakterija izazivajući njihove morfološke poremećaje. Djeluje na Gram + bakterije i na sve Gram - bakterije.

Dihidrostreptomycin sprečava sintezu bjelančevina u bakteriji i ima baktericidno djelovanje na Gram + i Gram - bakterije.

Njihovim sinergičnim djelovanjem sprečavaju rezistenciju bakterija na koje imaju baktericidan efekat.

INDIKACIJE

Repen se preporučuje kod infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na benzilpenicilin i dihidrostreptomycin sulfata, kao što su enteritisi, gastroenteritisi aktinomikoze, leptospiroza, pleuritis, pulmonitis, bronhitis, artritis, mastitis i infekcija urogenitalnog trakta, kao i kod sekundarnih infekcija kod svih povreda.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Intramuskularno i duboko.

- Kod goveda i konja 15-30 ml dnevno;
- Telad i ždrebac 5-10 ml dnevno;
- Svinje 10-15 ml dnevno;
- Prasad 3-5 ml dnevno;
- Ovce i koze 5-15 ml dnevno;
- Psi i mačke 2-10 ml dnevno.

UPOZORENJE

Ne daje se životinjama osjetljivim na penciline. Prije upotrebe preparat dobro promućkati

PREDNOSTI

Odličan odnos između ova dva antibiotika zbog njihovog sinergičnog djelovanja na mješovite bakterijske infekcije

KARENCA

Goveda, svinje, ovce i koze:

- Meso i unutrašnji organi: 74 dana;

Lijek se ne upotrebljava kod kopitara čije se meso koristi u ishrani ljudi.

Lijek se ne upotrebljava kod goveda, ovaca, koza i kopitara čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

NAČIN IZDAVANJA

Veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati u suhom i prozračnom prostoru.

ROK UPOTREBE

2 godine.

NAČIN PAKOVANJA

100 ml bočica

BROJI DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-1289/15 J.B., od 22. februara 2016. godine

PROIZVOĐAČ: **Fatro** s.p.a, *Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell Emilia (BO) Italy – Casella Postale/P.O. box 2*