

Rimadyl® injekcije

SASTAV

1 ml rastvora sadrži:

Aktivni sastojci:

Karprofen 50.0 mg

Ostali sastojci:

Benzil alkohol 10.0

L-Arginin 30.0

Glikoholna kiselina (100%) 88.5

Lecitin 169.0

Natrijum hidroksid q.s.

Hlorovodonična kiselina, koncentrovana q.s.

Voda za injekcije ad 1 ml

INDIKACIJE

Psi:

Za otklanjanje bola i zapaljenja nastalih poslije hiruških zahvata u ortopediji i na mekim tkivima (uključujući i hiruške zahvate na oku).

Mačke:

Za otklanjanje bola u postoperativnom periodu.

KONTRAINDIKACIJE

Ne aplikovati intramuskularno.

Ne prekoračiti propisanu terapijsku dozu i dužinu trajanja liječenja.

Ne upotrebljavati lijek kod oboljenja srca, bubrega i jetre. Ne upotrebljavati ga kod gastroenteritisa, ulceracija i krvarenja iz gastrointestinalnog sistema. Ne primenjuje se kod životinja alergičnih na ovaj preparat.

NUSPOJAVE

Nema

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Psi:

Preporučena doza je 4.0 mg/kg TM (1ml/12.5 kg TM), i.v. ili s.c., najbolje je aplikovati preoperativno, u vrijeme premedikacije ili za vrijeme uvođenja u anesteziju.

Da bismo produžili analgetsko i antiinflamatorno dejstvo postoperativno, parenteralnu terapiju treba nastaviti Rimadyl Palatable tabletama za žvakanje 4mg/kg/dan u toku 5 dana.

Mačke:

Preporučena doza je 4.0mg/kg (0.24ml/3.0kg tjelesne mase) i.v. ili s.c., najbolje aplikovati preoperativno u vrijeme uvođenja u anesteziju. Zbog dužeg poluživota i užeg terapijskog indeksa posebnu pažnju obratiti na to da se ne prekorači propisana doza ili ne ponovi preporučena doza. Preporučuje se upotreba insulinskih špriceva da bi se proizvod što tačnije dozirao.

Klinička ispitivanja kod pasa i mačaka sugerišu jednu dozu karprofena u prvih 24 sata poslije operacije. Ako je potrebna dublja analgezija u toku ovog perioda psu (ne i mačkama) možemo aplikovati polovinu doze (2mg/kg) karprofena ako je potrebno.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LIJEKA

Upotreba lijeka kod životinja mlađih od 6 sedmica ili kod starih životinja može predstavljati dodatan rizik. Ukoliko je primjena lijeka kod ovih životinja neophodna potrebno je primjeniti manju dozu lijeka uz pojačan nadzor. Izbjegavati primjenu lijeka kod dehidriranih, hipovolemičnih životinja ili životinja sa hipotenzijom, kao i u slučajevima kada postoji mogući rizik od pojave nefrotoksičnosti. Izbjegavati istovremenu primjenu potencijalno nefrotoksičnih lijekova i karprofena. NSAIL mogu prouzrokovati inhibiciju fagocitoze pa u liječenju zapaljenja koja su udružena sa bakterijskom infekcijom treba istovremeno uključiti antimikrobnu terapiju.

KARENCA

Nema karence

NAČIN ČUVANJA

Rok upotrebe: 3 godine. Čuvati u frižideru (2-8°C). Ne zamrzavati. Čuvati van domašaja djece.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana

ROK UPOTREBE

Otisnut na pakovanju

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Izdaje se na veterinarski recept

PAKOVANJE:

Bočica 20 ml zatvorena gumenim čepom i aluminijskom kapom

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-719-1/13 od 10.05.2013.

PROIZVOĐAČ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

ZASTUPNIK

Expertus Solutio doo Sarajevo

Dobrinjska do br.27

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina