
PRIJEDLOG UPUTSTVA ZA LIJEK

Robenz 66G
Robendin Hydrochlorid (66 g/kg)

NAZIV: Robenz 66G

Premiks za mediciniranu hranu

Za upotrebu u veterinarstvu**SASTAV:****Aktivne supstance:**

Robendin Hydrochlorid (66 g/kg)

Pomoćna sredstva:

Kalcij ligninsulfat: 4,0%

Kalcij dihidrat sulfat: do 100,0%

INDIKACIJE

Robenz® 66 G je efikasan u suzbijanju kokcidioze kod

- tovnih pilića: *Eimeria acervulina*, *E.maxima*, *E.tenella*, *E.necatrix*, *E.brunettii*, *E.mivati*

- ćuraka: *Eimeria adenoides*, *E.maxima*, *E.tenella*, *E.necatrix*, *E.brunetti*, *E.mivati*

KONTRAINDIKACIJE

Nema

NEŽELJENE REAKCIJE

Ukoliko se lijek primjenjuje u skladu sa uputstvom, nisu zabilježena neželjena djelovanja.

Lijek se vrlo dobro podnosi i ima visok terapijski indeks.

CILJANE VRSTE:

Tovni pilići (brojleri) i ćurke

DOZIRANJE ZA SVAKU VRSTU, NAČIN I METOD ADMINISTRACIJE:

Lijek se koristi u smjesi za starter i grover premiks u navedenoj količini i to:

Vrsta	Robenidin hidrohlorid	Robenz® 66 G u hranivu
Tovni pilići - brojleri	30-36 ppm	0,45-0,55kg/t
Ćurke	30-36 ppm	0,45-0,55kg/t

Lijek se ne smije miješati sa finišer premiksom.

SAVJET O ISPRAVNOJ ADMINISTRACIJI:

Robenz® 66 G se primjenjuje oralno, poslije temeljnog miješanja s hranom.

KARENCA

Meso peradi: 5 dana

Lijek se ne primjenjuje kod nesilica čija se jaja koriste u ishrani ljudi.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA SKLADIŠTENJE:

Skladištiti na suhom i hladnom mjestu na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svjetlosti.

Držati izvan dohvata i pogleda djece.

Rok upotrebe: 3 godine

Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrijebiti odmah

Rok upotrebe nakon miješanja s hranom: 3 mjeseca

SPECIJALNA UPOZORENJA

Za svaku ciljanu vrstu:

nema

Specijalna upozorenja koja trebaju poštovati osobe koje administriraju veterinarski proizvod životinjama:

Kod miješanja lijeka s hranom treba izbjegavati direktan kontakt s kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti rukavice i maske, kao i odgovarajuću zaštitnu odjeću. Ukoliko dospije u oči, isprati velikom količinom vode.

Pri radu ne piti, ne pušiti, ne jesti. Poslije upotrebe oprati ruke.

Ako se pojave alergijske reakcije, odmah potražiti pomoć ljekara.

Uvoznik ljekovitog premiksa, ukoliko se ne bavi proizvodnjom ljekovite hrane, promet može vršiti samo ako posjeduje ugovor o saradnji sa domaćim proizvođačem ljekovite hrane, kojem će isporučiti kompletnu količinu uvezenog ljekovitog premiksa. Ljekoviti premiksi se ne mogu naći u slobodnoj prodaji na malo i veliko.

Korištenje tokom graviditeta, laktacije, nošenja

Ne primjenjivati kod nosilja konzumnih jaja.

Interakcija s drugim medicinskim proizvodima i drugim oblicima

Robenidin se ne smije istovremeno upotrebljavati s drugim antikoagulantnim lijekovima.

Predoziranje (simptomi, postupci u slučaju nepredviđenih situacija, protivotrovi), u slučaju potrebe

Kod tovnih pilića deset puta veća doza ne dovodi do neželjenih efekata (330 ppm).

Kod ćuraka višestruko veće doze ne dovode do neželjenih efekata (750 ppm).

Lokalni efekti: moguća slaba iritacija očiju i kože.

Inkompatibilnost

Robenidin se ne smije istovremeno upotrebljavati s drugim antikoagulantnim lijekovima.

Specijalna upozorenja za neupotrijebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal, ako ih ima:

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen u skladu sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Službene novine FBiH“, br. 33/03).

PAKOVANJE: Višeslojna vreća od 20 kg

NAČIN IZDAVANJA:

Na recept veterinara

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-800/16 J.B., od 30. oktobra 2017. godine

PROIZVOĐAČ

Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l
Via Rubadello 6 41036 Medolla (Modena) Italija

ZASTUPNIK:

The Headhunter d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina