

Scalibor Protector Band
(za primjenu na životinjama)

Proizvođač: Intervet International b.v.
Adresa: Boxmeer, Holandija
Podnosilac zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH
Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

IME LIJEKA

Scalibor Protector Band
(za upotrebu u veterinarstvu)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Deltametrin 4% w/w.

INDIKACIJE

Kontrola infestacije krpeljima tokom 6 mjeseci.

Repelentni "anti-feeding" efekt (sprečavanje hranjenja) na flebotomne mušice („pješčana mušica – Phlebotomus perniciosus) tokom 12 mjeseci. Usljed repelentnog efekta, ogrlica se može koristiti i za smanjenje rizika od pojave lajšmanioze (uzročnik L.infantum). Ipak, prijenos lajšmanioze od strane „pješčane mušice“ ne može se u potpunosti isključiti, a ovisi od niza faktora vezanih za uslove okoliša.

Prevenција infestacije buhama tokom 4 mjeseca.

Repelentni "anti-feeding" efekt na odrasle komarce do 6 mjeseci.

Oglica se može koristiti samo na životinjama starijim od 7 nedjelja.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja kod kojih je poznata osjetljivost na piretroide.

Ne koristiti kod pasa sa ekstenzivnim ozljedama kože.

Ne koristiti kod kućica mlađih od 7 nedjelja.

CILINE VRSTE

Psi.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Izričito za vanjsku upotrebu. Postavlja se na vrat psa. Jedan okovratnik dužine 48 cm koristi se na psima male i srednje veličine; jedan okovratnik dužine 65 cm koristi se na velikim psima.

KARENCA

Nije primjenjivo.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Lijek se skladišti na temperaturi do 25 C.

POSEBNA UPOZORENJA

Ne koristiti kod mačaka.

Prati ruke sapunom i hladnom vodom nakon manipulacije kolarom.

Ne dozvoliti djeci mlađoj od 2 godine da diraju, igraju se i stavljaju u usta ogrlicu.

Ne koristiti istovremeno s drugim ekto-paraziticima koji sadržavaju organofosfate.

U slučaju da pas pojede ogrlicu, može doći do sljedećih simptoma: hipersalivacija, tremor, nekoordinisani pokreti, povraćanje. Ovi simptomi obično nestaju za 48 sati. Kao antidot može se koristiti dijazepam. Deltametrin je štetan za ribe, druge vodene životinje i pčele..

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-43/19 J.B.; od 07. marta 2019. godine

OSTALI PODACI

Pakovanje: Kutija sa 6 ogrlica dužine 48 cm ili 65 cm.

Rok upotrebe: 3 godine.

Način izdavanja: Bez veterinarskog recepta.

ATCvet kod: QP53AC11

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intevet International b.v; Boxmeer, Holandija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanjaska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina