



ScourGuard® 4KC

Inaktivirana vakcina protiv: bovinog rotavirusa, bovinog koronavirusa, Clostridium perfringens (tip C) i E.coli

SASTAV

Inaktivirani bovini rotavirus, serotip G6 i G10; Inaktivirani bovini koronavirus; inaktiviranu enterotoksičnu E.colli (K99), i Clostridium perfringens Tip C toxoid.

Vakcina sadržava gentamicin kao konzervas.

INDIKACIJE

ScourGuard 4KC koristi se za imunizaciju zdravih gravidnih krava i junicica kao pomoć u prevenciji dijareja njihove teladi uzrokavanih sa bovinim rotavirusem (serotip G6 i G10), bovinim koronavirusom, enterotoksičnim sojem E.coli koja sadrži K99 adhezivni faktor i Cl.perfringens Tip C

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Zdravim gravidnim kravama i junicama aplicira se po 2 ml cjepiva intramuskularno. Prije aplikacije vakcine je potrebno promućkati, te koristiti sterilne šprice i igle.

Primovakcinacija:

Potrebno je aplicirati dvije doze cjepiva gravidnim kravama i junicama u razmaku od 3 sedmice, s tim da druga doza treba biti aplicirana 3-6 sedmica prije telenja.

Revakcinacija (docjepljivanje):

Potrebno je aplicirati jednu dozu cjepiva 3-6 sedmica prije svakog narednog telenja.

NUSPOJAVE

Ovaj proizvod se pokazao efikasan kod zdravih životinja. Zaštitini imuni odgovor ne može se postići ako je životinja u inkubaciji, pothranjena ili infestirana parazitima, izložena stresu uslijed transporta ili drugih okolnosti, ili ako se vakcina ne primjenjuje prema uputstvu.

Kao i kod drugih vakcina anafilaksija je moguća. U tim slučajevima primjeniti odgovarajuću terapiju.

Nakon aplikacije može doći do prolaznog kratkotrajnog povećanja tjelesne temperature.

Interakcije s drugim proizvodima nisu utvrđene.

KARENCA

Za meso, organe i ostala jestiva tkiva iznosi 21 dan.

Za mlijeko: obzirom da vakcina nije namjenjena za grla u laktaciji, karenca nije propisana.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom i hladnom mjestu (2° – 7° C). Ne zamrzavati. Izlaganje visokim temperaturama može utjecati na imunogenost proizvoda.

ROK UPOTREBE

18 mjeseci u originalnom pakovanju. Jednom otvorenu bocu potrebno je odmah utrošiti.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

PAKOVANJE

Plastične bočice sa 10 i 50 doza vakcine.

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-699-1/13 od 24.04.2013.

PROIZVOĐAČ

Zoetis Inc.

Kalamazoo, MI 49007

USA

ZASTUPNIK

Expertus Solutio doo Sarajevo

Dobrinjska do br.27

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina