

# **SINTOFARM**

# **ADRIATICA**

# **d.o.o.**

**VIII ul. br. 57, 76270 Orašje**

**ID broj: 4254130240000**

**PDV broj: 254130240000**

**Tel./fax: +387 31/717-168**

**e-mail: info@sintofarm-adriatica.com**

## **SELEVIT**

### **Injekcioni rastvor za telad, janjad, prasad i ždijebad Za upotrebu u veterinarstvu**

#### **SASTAV u 1 ml**

Natrijum selenit pentahidrat	0,5 mg
α - tokoferol (Vitamin E)	70 mg
Cijan Kobalt amin (Vitamin B12)	0,1 mg
Adenosine-5-mono-fosfat	5 mg
Sorbitol	50 mg

Pomoćne supstance: Natrijum-propil-parahidroksil-benzoat 0,15 mg,  
Natrijum-metil-parahidroksil-benzoat 1,15 mg, sterilna voda za injekciju do 1 ml

#### **DJELOVANJE**

Selevit, kroz kombinovane i komplementarne akcije aktivnih komponenti, spriječava formacije peroksida i uzročnu degeneraciju mišića, srca, jetre, cerebralnih i krvih tkiva, te reproduktivnih organa. Selenium je neophodan za glutation – peroksidalnu aktivnost, što ima ključnu ulogu u zaštiti od peroksidalne štete. Vitamin E je antioksidans zida ćelije i njegove akcije su time suplementarne akcijama selenijuma. Vitamin B12 igra ulogu u sintezi nuklearne kiseline i proteina, te stimuliše regeneraciju i rast ćelije. Adenosine- 5 – monofosfat (AMP) je aktivan u sintezi nuklearne kiseline i ATP-a, i nužan je za snagu i opskrbljenošću mišića.

#### **INDIKACIJE**

Selevit se koristi u terapiji mišićne distrofije kod teladi, janjadi, prasadi, ždrijebadi. Zatim se koristi kod dijetetske hepatoze prasića, srčanih oboljenja i mikroangiopatije,

eksudativne dijateza prasadi, miozitisa, mijastenije, neuritisa i mišićnog umora/slabosti pri prekomjernom radu mišića.

#### KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati na životinjama kod kojih je utvrđena peosjetljivost na sastojke lijeka.

#### DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Proizvod se može aplicirati intramuskularno, podkožno ili intravenozno (u posljednjim slučajevima aplicirati veoma sporo), u sljedećim dozama:

**Telad i ždrijebad:** 10 - 20 ml / dan

**Janjad i prasad:** 10 ml / dan

Aplicirati preporučene doze jednom dnevno 5 uzastopnih dana.

Kod naprednih faza mišićne distrofije aplicirati dva puta gore spomenute doze.

Kod profilakse mišićne distrofije: aplicirati preporučene doze jednom sedmično 5 uzastopnih sedmica, počevši tretman od desetog dana života životinje.

#### PREDOZIRANJE

Simptomi predoziranja selenom se pokazuju kao depresija, ataksija, otežano disanje, dijareja, slabost u mišićima.

#### NUSPOJAVE

Nisu poznate.

#### INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Ne mješati sa ostalim ljekovima.

#### KARENCA

- Meso i iznutrice: 0 dana
- Mlijeko: 0 dana

#### NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

#### NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, mračnom i hladnom prostoru.

Držati dalje od dohvata djece.

#### ROK UPOTREBE

2 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora utrošiti u roku od 28 dana.

#### PAKOVANJE

50 ml bočica, 100 ml bočica

**POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA**

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

**BROJ I DATUM ODOBRENJA:** UP-I-06-2-24/17-1402/17 J.B, od 09. 11. 2017. godine

**VLASNIK I PROIZVOĐAČ:** **Fatro s.p.a**, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy  
– Casella Postale/P.O. box 2

**UVODNIK I DISTRIBUTER:**

**SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje**, VIII ulica br. 57, 76270 Orašje, BiH

Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)