

AVIPRO ND VAC LA SOTA
ZA UPOTREBU U VETERINARSTVU

Sastav: 1000 doza liofilizirane vakcine sadržava u 250 mg suhe substance 109 EID₅₀ virusa atipične kuge peradi - njukaslske bolesti soj La Sota, umnoženog u kokošijim embrioniranim SPF jajima.

Djelovanje: Vakcina stimulira stvaranje specifičnih antitijela na virus atipične kuge peradi - njukaslske bolesti. Poslije oralnog unošenja putem vode za piće razvija se aktivni imunitet nakon osam (8), do maksimalno 16 dana. Imunitet nakon uspješne vakcinacije traje samo četiri (4) do pet (5) mjeseci pa je neophodna revakcinacija u korektno utvrđenom(im) vremenskom(im) intervalu(ima).

Neznatno predoziranje nije štetno, poddoziranje uzrokuje slab imunitet.

Indikacije: Za zaštitnu inokulaciju - vakcinaciju pilića i odrasle peradi protiv atipične kuge peradi - njukaslske bolesti.

Aplikacije i doze: Vakcina se, nakon rastvaranja, daje u vodi za piće ili sprej vakcinacijom.

Davanje u vodi za piće:

Vakcinacija u dobi od 21. dana - vakcinu za 1000 jedinki umiješati u 15 litara vode za piće.

Vakcinacija u dobi od sedam (7) sedmica - vakcinu za 1000 jedinki umiješati u 20 litara vode za piće.

Vakcinacija u dobi od 14 sedmica - vakcinu za 1000 jedinkumiješati u 30 litara vode za piće.

Vakcinacija u dobi od 20 sedmica i starije - vakcinu za 1000

jedinki umiješati u 40 litara vode za piće.

Da bi sve jedinke popile odgovarajuću količinu vode, odnosno uzele odgovarajuću dozu

vakcine, treba im uskratiti vodu (zažedniti ih) dva (2) sata prije vakcinacije.

Sprej vakcinacija:

Ovaj način vakcinacije, uz mjere opreza pri izvođenju, uzrokuje brz i djelotvoran imunitet.

Sprej metodom se vakciniraju perad od četiri (4) sedmice i starija. 1000 doza vakcine treba rastvoriti u 200 ml nehlorirane, ili bolje, destilirane vode. Aparati za sprej vakcinaciju trebaju biti kontrolirani u odgovarajućim institucijama

Pilići od imunih roditelja posjeduju pasivni imunitet do četiri sedmice, pa treba utvrditi optimalan termin prve vakcinacije kako bi se kod njih postigao dobar aktivni imunitet.

Revakcinacija je moguća nakon tri (3) do četiri (4) sedmice uz prethodno osiguranje kontrole imuniteta.

La Sota soj virusa u vakcini je neškodljiv za zdrave ptica.

Kontraindikacije:

Klinički bolesna ili transportom iscrpljenu perad ne smije se vakcinirati.

AviPro ND vac La Sota ne treba koristiti za sprej vakcinaciju peradi u prve tri sedmice života (u ovom periodu treba koristiti vakcine pripremljene sa Hitchner B 1 vakcinalnim sojem).

Nuspojave: Nema ih i ne postoji interakcija sa drugim substancama pod uvjetom da voda za piće ne sadrži bilo kakve dezinficijense.

Karencija: Ne postoji.

Napomena:

1. Pažnja! Živa vakcina! Nije ju dopušteno nanositi na oči!

2. Prilikom korištenja sprej metode vakciniranja treba osigurati zaštitu od udisanja vakcine ili njenog kontakta s očima.

Prazne i neiskorištene otvorene boćice moraju biti neškodljivo uništene.

Čuvanje: Lijek se čuva na tamnom mjestu pri temperaturi od 2 do 8°C.

Rastvorenu vakcinu treba zaštititi od direktnе sunčeve svjetlosti.

Pakovanje: 10X1000 doza, 10x5000 doza

Rok upotrebe: Označen na pakovanju

Način izdavanja: Izdaje se na recept

Broj i datum rješenja: UP-I-06-2-24/17-1348/11 24.06.2011

Proizvođač: Lohmann Animal Health GmbH, Cuxaven, Njemačka

Uvoznik i distributer : „BOSNA VET“ doo,

Goraždanska 36A, ZENICA , BIH

Tel: 032/423-196, fax: 032/423-194