



*endoektocid,
avermektinski nematocid i
za pse i mačke*

za pse i mačke

SASTAV
1 mL 6 %-tne otopine Stronghold® za spot on primjer
Selamektin – djelatna tvar
mg

Pomoći

dipropilenglikol metileter i butilirani-hidroksitolue

Ostatko - izopropilni alkohol koliko je dovoljno
mL

Kao i drugi avermektini Stronghold® remeti živča ubija brojne parazitske beskičmenjake. U meni avermektini se upliju u prolaz jopa klera kroz jopu.

parazita prekidaju prijenos podražaja. Time zakoče električnu aktivnost u živčanim ćelijama nekih nematoda i mišićnim ćelijama parazitskih člankonožaca, što uzrokuje njihovu paralizu i uginuće. U preporučenim

Image Object

INDIKACIJE

- Uništavanje buha na psima i mačkama i dugotrajna zaštita od reinfestacije.
- Suzbijanje i liječenje infestacije mačaka i pasa ušima (*Felicola subrostratus*, *Trichodectes canis*).
- Suzbijanje i nadzor alergijskog dermatitisa pasa i mačaka uzrokovanih ubodima buha.
- Zaštita legla od infestacije buhami i adultnim stadijima crijevnih nematoda (*Toxocara cati*, *Toxocara canis*). – tretiraju se gravidne i dojne kuje i mačke.
- Sprječavanje invazije pasa i mačaka srčanim nematodom (*Dirofilaria immitis*).

- Liječenje i sprječavanje sarkoptoze pasa (*Sarcoptes canis*).
 - Liječenje i sprječavanje invazije mačaka crijevnim nematodima *Ancylostoma tubaeforme* i *Toxocara cati*, te sprječavanje invazije pasa nematodom *Toxocara canis*.

Dijelovanje i sprječavanje infestacije buhama i ušima

Stronghold® je indiciran za uništavanje i dugotrajnu zaštitu pasa i mačaka od infestacija buhama (*Ctenocephalides spp.*) i ušima (*Felicola otostratus*, *Trichodectes canis*). Ukoliko je životinja prilikom prve primjene *Stronghold®*-a već bila infestirana buhama, odrasle će buhe biti stene i prekinuti će se nesenje vitalnih jajašaca (ovicidni i larvicidni ak).

Pomoć u liječenju i kontrola alergijskog dermatitis

Stronghold® je indiciran za pomoć u liječenju i nadzor alergijskog dermatitisa pasa i mačaka uzrokovanih ubodima buha. Ukoliko se životinja vrlo intenzivno češu ponekad je, na početku tretmana, nužno provest simptomatsku terapiju.

po partusu itd. siguran je i djelotvoran postupak sprječavanja invazija štenadi i mačića na sisi (do dobi od 7 nedjelja) crijevnim nematodima (Toxocara canis, Toxocara cati) i buhamama (Cteocephalides spp.).

Sprječavanje dirofilarioze
Da bi se u zemljama tj. u područjima gdje postoje prenosioci (npr. komarci sprječila invazija pasa srčanim nematodom (*Dirofilaria immitis* Stronghold®) treba primjenjivati 1x na mjesec (npr.u Istri – Hrvatska, je dokazano nekoliko slučajeva dirofilarioze pasa). U tu svrhu Stronghold® se može davati tijekom cijele godine, a najmanje unutar mjesec dana od prvog

intervalima sve do završetka sezone komraca. Zadnju dozu mora se dati unutar mjesec dana od posljednjeg izlaganja životinje komarcima. Ukoliko se jednu aplikaciju propusti, to jest ako međudozni interval bude veći od mjesec dana, tada će se trenutnim davanjem Stronghold®-a i obnovom mjesечne aplikacije smanjiti mogućnost razvoja odraslih dirofilarija. Ukoliko se mijenja preventivni program uništavanje dirofilarija s nekim drugim sredstvom, prvu dozu Stronghold®-a mora se primijeniti unutar mjesec dana od aplikacije zadnje doze prethodnog pripravka.

Liječenje i suzbijanje ušne šuge u mačaka
Da bi se eliminiralo ušne šugarce *Otodectes cynotis* Stronghold® je dovoljno primjeniti jednokratno. U pojedinih je mačaka, za cjelovito suzbijanje otodektesa, ponekad nužno drugu dozu Stronghold®-a ponoviti za mjesec.

macke usnili sugarcima. Prije terapije usne suge zvukovode invadiranih životinja (cerumenolitik).

potrebno je odgovarajućim kapima za uho smanjiti eventualni svrbež ili paralelnu bakterijsku infekciju.

aplikacijom selamnjetina spriječiti će se eventualne šugarcem.

kasnije infestacije.

Sprječavanje i suzbijanje invazije mačaka crijevnim nematodima

Za suzbijanje crijevnih nematoda *Ancylostoma tubaeforme* i *Toxocara cati* Stronghold® se daje jednokratno. Dodatnim tretiranjem mačaka 1x na mjesec spriječiti će se eventualne kasnije infestacije.

KONTRAINDIKACIJE

Stronghold® se ne smije davati štenadi i mačićima mlađim od 6 tjedana, a ne smije se davati ni u vanjski zvukovod pasa i mačaka.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Jedan puta mjesечно aplicira se sadržaj jedne tube, to jest najmanje 6 mg selamektina/kg. Stronghold® se dozira u skladu sa slijedećom tabelom:

| Mačka (težina u kg) | Boja kapice na tubi | Sadržaj selame- ktina u 1 tubi | Koncentracija selamektina | Apl. volumen u 1 tubi |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| < 2,5 2,6 – 7,5 | ružičasta plava | 15 mg 45 mg | 6 % 6 % | 0,25 ml 0,75 ml |
| Pas (težina u kg) | Boja kapice na tubi | Sadržaj selame- ktina u 1 tubi | Koncentracija selamektina | Apl. volumen u 1 tubi |
| < 2,5 | ružičasta | 15 mg | 6 % | 0,25 ml |

Stronghold® tubu izvadi se iz zaštitne opreme.

Držeći tubu uspravno, čvrsto se pritisne kapica da se probuši membrana na aplikatoru. Kapica se makne sa tube. Potom se razmakne dlaka da se vidi koža u međulopatičnom području, tj. na gornjem dorzalnom dijelu vrata. Vrh tube stavi se izravno na kožu životinje, a sadržaj Stronghold®-a istisne na jednom mjestu. Treba izbjegći dodir Stronghold®-a s prstima.

NAPOMENA

Prije uporabe treba pročitati priloženo uputstvo.

- Ovaj proizvod smije se primjeniti samo na površinu kože. Ne smije ga se dati peroralno, parenteralno ili u zvukovod. Stronghold® se ne aplicira na životinju ukoliko joj je dlaka mokra ili onečišćena. Dva sata ili više nakon aplikacije, psa se može prati i šamponirati, pri čemu se ne umanjuje učinkovitost Stronghold®-a.
- Stronghold® se može upotrebljavati u gravidnih i dojnih pasa i mačaka.
- U kontroliranim istraživanjima Stronghold® je bio uspješno korišten usporedno s vakcinama, antibioticima, glukokortikoidima, anthelminticima i ektoparaziticidima (ovratnici, šamponi, kupke).
- Proizvod je vrlo zapaljiv te ga se mora držati dalje od izvora topline, strojeva koji iskre, otvorenog plamena i uređaja za paljenje.
- Za vrijeme korištenja svih endoektocida ne smije se pušiti, piti i jesti.
- Nakon završene aplikacije treba sapunom i vodom oprati ruke, kao i svako mjesto na vašoj koži koje je došlo u dodir s pripravkom. U okolnostima da vam proizvod dospije u oko treba ga isprati vodom i po potrebi zatražiti savjet liječnika.
- Odmah po aplikaciji potrebno sprječiti dodir s tretiranom životinjom, to jest ljubimce se ne smije dirati dok se to područje ne osuši.
- Selamektin je toksičan za ribe i određene organizme vodenih ekosistema. Opremu i zaostali sadržaj u tubama treba odložiti s kućnim tzv. komunalnim otpadom, te izbjegći zagađivanje nadzemnih i podzemnih vodotokova.

NUSPOJAVE

Na mjestu aplikacije mačkama ponekad ispadne malo dlake. Takve alopecije spontano nestanu, no u pojedinim okolnostima treba poduzeti simptomatsko liječenje.

Predoziranje - simptomi, postupak u slučaju nužde, antidoti

Stronghold® je bio testiran na više od 100 različitih čistokrvnih pasmina pasa i križanaca. Testiran je i na škotskim ovčarima (coli) i njihovim križancima te na 16 čistokrvnih pasmina mačaka. Sigurnost pripravka provjerena je u gravidnih i dojnih ženki; mužjaka i ženki koje se koristi u rasplodu te štenadi i mačića u dobi od 6 tjedana i starijih.

Stronghold® je bio dan u 10x većoj dozi od preporučene, pri čemu nisu utvrđeni neželjeni učinci. Isto tako Stronghold® je dan u dozi 3x većoj od preporučene psima i mačkama invadiranim srčanim nematodom te škotskim ovčarima osjetljivim na ivermektin, pri čemu ni u jedne životinje nisu primjećene nuspojave.

KARENCA

Nije propisana jer se Stronghold® ne koristi za suzbijanje ekto- i endoparazita na životnjama koje služe u proizvodnji namirnica za prehranu ljudi.

NAČIN ČUVANJA

Na tamnom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 30 °C) i izvan dosega djece. Lijek se ne smije pohraniti na mjestima gdje se drži hrana za ljude ili životinje.

ROK UPOTREBE

Označen je na opremi - u izvornoj ambalaži 2 godine.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

PAKOVANJE

- Aluminijski blister s 3 polipropilenske tube sa ružičastom kapicom, sa po 0.25 mL 6 %-tne otopine selamektina (15 mg).
- Aluminijski blister s 3 polipropilenske tube sa plavom kapicom, sa po 0.75 mL 6 %-tne otopine selamektina (45 mg).

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-1290/13 od 30.09.2013.

PROIZVOĐAČ

Zoetis Belgium, Belgija

ZASTUPNIK

Expertus Solutio doo Sarajevo

Dobrinjska do br.27

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina