

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

SULFAPRIM

Injekcioni rastvor

SASTAV

Sulfametoksin natrij	200 mg
Trimetoprim	40 mg
Nosač tečni	do 1 ml

DJELOVANJE

Ovo je lijek koji se bazira na sastavu Sulfadimetokssina i Trimetoprma u odnosu 5:1. Obje aktivne supstance u lijeku djeluju udruženo u dvije faze sprečavajući sintezu folne kiseline neophodne za razmnožavanje bakterija. Efekt ovog udruženog djelovanja manifestira se pojačanom antibakterijskom aktivnošću koja onemogućava rezistenciju bakterija na ovaj lijek. Lijek ima široki spektar djelovanja i ispoljava baktericidno djelovanje na Gram + i Gram - bakterije kao i na protozoe. Prednost ovog lijeka je u tome što se aktivne supstance resorbiraju vrlo brzo u organizmu životinje, a samim tim i ispoljavaju za kratak period negativan efekat na Gram + i Gram - bakterije i protozoe. U krvi se 98 %-99 % veže za proteine plazme. U slobodnoj formi se raspoređuje u raznim dijelovima organizma što zavisi od vaskularizacije tkiva. Najveću koncentraciju postiže u organima u kojima se vrši metabolizam kao što su jetra i organima za izlučivanje (bubrezi).

Trimetoprim se apsorbira vrlo brzo i dolazi u krvi, kojom se prenosi do jetre i bubrega gdje mu je koncentracija vrlo visoka.

Eliminacija lijeka u najvećem dijelu se vrši putem urina, manjim dijelom i putem izmeta.

INDIKACIJA

Djeluje na goveda, svinje, kopitare, mačke i pse. Upotrebljava se za liječenje upale pluća, bronhitisa, pleuritica, gastroenteritisa, peritonitisa, metritisa, mastitisa, sepse, artritisa kod konja, flegmona, apscesa u liječenju rana prije i poslije intervencija - kod svih infekcija izazvanih Gram + i Gram - bakterijama i protozoica osjetljivim na Sulfadimetoksin i Trimetoprim.

NAČIN UPOTREBE I DOZE

Upotrebljava se intramuskularno i intravenozno (sporo davanje).

Doze:

- Goveda 10-20 ml /100 kg žive mase dnevno
- Svinje 10-20 ml/100 kg žive mase dnevno
- Konji 10-20 ml/100 kg žive mase dnevno
- Psi i mačke 1 ml-2 ml/ 10 kg žive mase
što odgovara 24 - 48 mg smjese Sulfadimetokssina i Trimetoprime na kg žive mase dnevno.

Terapiju ponoviti samo po preporuci veterinara.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU POJEDINU VRSTU KOJOJ JE NAMJENJEN

Zbog mogućih promjena i osjetljivosti mikroorganizama, prije upotrebe ovog lijeka treba napraviti antibiogram.

Neodgovarajuće korištenje proizvoda može dovesti do rezistencije bakterija na aktivne komponente lijeka i smanjiti njihovu djelotvornost liječenja, zbog moguće pojave unakrsne otpornosti na lijek.

NAPOMENA

Poslije upotrebe lijeka životinjama ponuditi velike količine vode. Može se koristiti u kombinaciji sa lijekovima iz grupe B laktamina i aminoglikozida.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati životinjama sa oštećenim bubrezima i jetrom.

NUSPOJAVE

Velike doze ovog lijeka mogu prouzrokovati gastrointestinalne tegobe, depresije CNS, promjene u kičmenoj moždini (anemije i leukopenije) i oštećenja u jetri.

KARENCA

Meso:

- Goveda 20 dana
- Svinje 16 dana
- Konji 30 dana

Mlijeko

- Goveda 96 sati (8 muza)

Ne davati kobilama čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

NAČIN IZDAVANJA

Na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, tamnom i hladnom mjestu.

ROK UPOTREBE

5 godina

PAKOVANJE

Bočice sa 100 ml, 250 ml i 1000 ml

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-1291/15 J.B., od 22. februara 2016. godine

*PROIZVOĐAČ: **Fatro** s.p.a, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell Emilia (BO) Italy – Casella
Postale/P.O. box 2*