

# **SINTOFARM**

# **ADRIATICA**

## **d.o.o.**

**VIII ul. br. 57, 76270 Orašje**

**ID broj: 4254130240000**

**PDV broj: 254130240000**

**Tel./fax: +387 31/717-168**

**e-mail: info@sintofarm-adriatica.com**

### **TIAMULIN 10**

#### **Premix za mediciniranu hranu**

##### **SASTAV**

Aktivna supstanca : Tiamulin Hidrogen Fumarat 100 mg

Nosač: do 1 g

##### **ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA**

Svinje.

##### **INDIKACIJE**

Koristi se u liječenju Mikoplazmoza – enzootska pneumonia svinja (*Mycoplasma hyopneumoniae*), površinskog nekrotičnog enteritisa izazvanog *Lawsonia intracellularis* senzibilnog na Tiamulin.

Prije provođenja terapije ovim lijekom utvrditi rezistenciju mikroorganizama na djelatnu tvar lijeka - antibiogramom. Samo kod nepostojanja rezistencije na djelatnu tvar koristiti preparat u terapiji.

##### **KONTRAINDIKACIJE**

Ne davati životinjama kod kojih je utvrđena preosjetljivost na Tiamulin. Ne davati istovremeno lijek sa jonoforima poput Monenzina, Narazina, Salinomicina ili 7 dana od predhodnog korištenja navedenih jonofora.

Zabilježeni su rijetki slučajevi pojave akutnog dermatitisa, kožnog crvenila, intenzivnog svrbeža i fotoosjetljivosti. Uglavnom su nuspojave blage i prolazne.

Ukoliko se ustanove ovi tipični neželjeni efekti, treba smjesta prekinuti liječenje, očistiti životinje i promijeniti hranu.

## NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Utvrđiti preciznu tjelesnu masu životinja.

Lijek se koristi umješan u hrani i to 157 – 250 g/100 kg stočne hrane (što odgovara 125 – 200 mg Tiamulina/1 kg stočne hrane, odnosno 3,7 – 6 mg aktivne supstance/1 kg tjelesne mase) tokom 3 – 5 dana.

## UPOZORENJE

### Posebna upozorenja za svaku pojedinu vrstu

Uzimanje ljekovite hrane od strane životinja može se mijenjati u odnosu na tok bolesti. Za one životinje kod kojih se uoči smanjeno uzimanje vode treba primjeniti liječenje parenteralnim putem koristeći odgovarajući proizvod u vidu injekcija po savjetu veterinarskog liječnika.

Učestalo korištenje ili produženo treba izbjegići, poboljšavanjem uvjeta držanja i putem čistoće i dezinfekcije.

Ne koristiti u vodi za piće ili u tečnoj hrani.

### Posebne mjere opreza kod primjene:

#### 1. Posebne mjere opreza primjene kod životinja:

Ukoliko je moguće, ovaj proizvod treba koristiti samo na osnovu rezultata antibiograma. Kad se koristi proizvod treba uzeti u obzir epidemiološku situaciju područja gdje se životinje nalaze.

Neodgovarajuća upotreba proizvoda mogla bi dovesti do povećanja broja bakterija otpornih na tiamulin i smanjiti djelotvornost liječenja sa drugim antibioticima zbog moguće pojave unakrsne otpornosti.

Ne ostavljati ljekovitu hranu na dohvat životinja koje nisu pod terapijom.

Izbjegavati davanje lijeka zajedno sa proizvodima koji sadrže ionofore poput monenzina, narazina, ili drugih ionofornih monovalentnih antibiotika zato što se mogu pojaviti patološke pojave kao: zaostajanje u rastu, ataksija, pareza, porast smrtnosti kod mladih jedinki. Obavijestiti dobavljača hrane o korištenju tiamulina, s ciljem da se izbjegne mješanje/upadanje navedenih proizvoda u stočnu hranu i njena kontaminacija. U slučaju da se sumnja na kontaminaciju, stočna hrana treba biti testirana da bi se utvrdilo prisustvo ovih ionofora prije nego bude davana životinjama. Ukoliko se pojave nepogodne reakcije zbog interakcije treba odmah prestati davanje hrane. Ukloniti stočnu hranu koja je kontaminirana što je prije moguće i zamijeniti je sa nekontaminiranom.

#### 2. Posebne mjere opreza koje trebaju biti primjenjene od strane osobe koja daje proizvod životinjama:

Osobe kod kojih je potvrđena preosjetljivost na tiamulin trebaju izbjegavati kontakt sa veterinarskim lijekom. Ne udisati, izbjegavati kontakt sa kožom, očima i sluzokožom. Ne jesti, ne piti ili pušiti tokom rukovanja sa proizvodom. Dobro očistiti sredstva za miješanje. Radnici u tu svrhu moraju nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću: kombinezon, nepropusne rukavice i zaštitni aspirator za lice za jednokratnu upotrebu (maska protiv prašine za jednokratnu upotrebu, respirator za jednokratnu upotrebu). Moraju osim toga prati ruke nakon rada sa proizvodom. U slučaju kontaminacije kože ili očiju isprati dobro vodom i sapunom. Ukoliko iritacija ostane, konsultovati liječnika.

## **KARENCA**

- Svinje:
  - meso i iznutrice: 20 dana.

## **NAČIN IZDAVANJA:**

Izdaje se na veterinarski recept.

## **NAČIN ČUVANJA**

Proizvod čuvati u tamnoj, suhoj i prozračenoj prostoriji.

## **ROK UPOTREBE**

Rok trajanja veterinarskog lijeka 24 mjeseca.

Nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 2 mjeseca.

Nakon trajanja mješavine lijeka i stočne hrane 2 mjeseca.

## **PAKOVANJE**

- 10 kg
- 25 kg

## **UKLANJANJE VIŠKA LIJEKA**

Lijek koji nije iskorišten mora se odložiti i uništiti u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine FBiH“ broj 33/03).

**BROJ I DATUM ODOBRENJA:** UP-I-06-2-24/17-770/16 J.B.; 24.06.2016.

**PROIZVODAČ:** *Filozoo Srl; Via del Commercio 28-30 Carpi (Modena)*

*Tel: +39059637311*