

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o

VIII Ulica Broj 57,76270 Orašje

ID Broj: 4254130240000

PDV Broj: 254130240000

Tel/Fax: +38731/717-168

E-mail: info@sintofarm-adriatica.com

TILOSINA 20% FILOZOO

Prašak rastvorljiv u vodi za oralnu primjenu kod svinja i brojlera

SASTAV : 1 gram proizvoda sadži:

Aktivna supstanca: Tilozin 200 mg (kao Tilozin tartarat)

Nosač do 1000 mg

ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA

Svinje i Brojleri

INDIKACIJE

Prije provođenja terapije ovim lijekom utvrditi rezistenciju mikroorganizama na djelatnu tvar lijeka - antibiogramom. Samo kod nepostojanja rezistencije na djelatnu tvar koristiti preparat u terapiji.

SVINJE: Lijek se koristi u liječenju Nekrotičnog enteritisa, enzootskog pulmonitisa, izazvanog mikoplazmama i bakterijama koje su osjetljive na Tilozin.

BROJLERI: Koristi se u liječenju bolesti respiratornog i gastro-intestinalnog trakta (hronične respiratorne bolesti- CRD, nekrotičnog enteritisa i infektivnog sinusitisa).

Lijek se ne koristi kod koka nosilja.

KONTRAINDIKACIJE

Ne davati čivotinjama koje su preosjetljive na aktivnu supstancu Tilozin. Ne davati zivotinjama na kojima je utvrđena otpornost na Tilosin i ostale makrolide.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Da bi se izbjeglo nedovoljno doziranje treba ustanoviti najpre tjelesnu težinu životinja kako bi se životinjama ponudile ispravne doze tokom liječenja.

Svinje: umiješati 1,25 g-1,50 g proizvoda/na litar vode ili tečne hrane (koji odgovara 10 mg -12 mg tilozina /kg žive mase životinja toko 3-5 dana

Brojleri: Umiješati 1250 g proizvoda/ 1000 litara vode za piće (sto odgovara 25 mg proizvoda na kg žive mase brojlera).

Proizvod se životinjama daje isključivo putem vode za piće brojlerima ili putem tečne hrane ili vode -svinjama .

UPOZORENJE

Posebna upozorenja za svaku pojedinu vrstu

Uzimanje vode sa lijekom od strane životinja može se mijenjati u odnosu na bolest. Za one životinje kod kojih se uoči smanjeno uzimanje vode treba primijeniti liječenje parenteralnim putem koristeći odgovarajući proizvod u vidu injekcija po savjetu veterinarskog liječnika.

Ne davati konzumnim nosiljama koje nose jaja za ljudsku ishranu.

Koristiti lijek samo nakon što je utvrđena osjetljivost bakterija na aktivnu tvar. Preporuča se uraditi antibiogram prije početka liječenja. Učestalo i produženo korištenje treba izbjegavati, poboljšanjem uvjeta uzgoja putem čistoće i dezinfekcije.

Posebne mjere opreza kod primjene:

1. Posebne mjere opreza primjene kod životinja:

Upotreba proizvoda na način koji nije u skladu sa uputstvima može dovesti do povećanja broja bakterija otpornih na tilostin i može stvoriti smanjenu efikasnost liječenja makroidnim antibioticima i linkosamida zbog pojave unakrsne otpornosti.

Ne ostavljati rastvor lijeka na dohvat životinja koje nisu pod terapijom ili divljih životinja.

Visok stepen otpornosti „In Vitro“ pokazao se kod vrste *Brachyspira hyodysenteria*, pokazujući da ovaj lijek nije dovoljno efikasan protiv dizenterije kod svinja.

2. Posebne mjere opreza koje trebaju biti primjenjene od strane osobe koja daje proizvod životinjama:

Pomješati dobro u vodu za piće.

Primijeniti uobičajene mjere procedura pripreme ili davanja proizvoda. Nisu neophodne posebne mjere opreza kod radnika, u svakom slučaju je dobro izbjegavati direktan kontakt; savjetuje se korištenje maske i zaštitnih rukavica pogodnih za rad sa proizvodom.

Ne jesti, piti ili pušiti tokom upotrebe proizvoda. Nakon korištenja oprati dobro ruke. U slučaju nenamjernog kontakta sa kožom ili očima, isprati dobro sa vodom i sapunom. Ukoliko je iritacija uporna obratiti se liječniku.

Osobe kod kojih je potvrđena preosjetljivost na kolistin trebaju izbjegavati kontakt sa veterinarskim lijekom.

INKOMPATIBILNOST

Istovremeno korištenje Tilosina i Lincizamida dovodi do smanjenja djelotvornosti oba lijeka.

NAČIN ČUVANJA

Proizvod čuvati u tamnoj, suhoj i prozračenoj prostoriji.

KARENCA

Brojleri: Meso i iznutrice 3 dana

Svinje: Meso i iznutrice 0 dana.

Lijek se ne koristi kod koka nosilja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

ROK UPOTREBE

Originalno pakovanje 2 godine. Nakon prvog otvaranja 1 mjesec. Nakon rastvaranja u vodi 12 sati, a rastvoren i tečnoj hrani upotrijebiti odmah.

NAČIN PAKOVANJA

Plastične kantice od 1 kg i vreće od 5 kg.

UKLANJANJE VIŠKA LIJEKA

Lijek koji nije iskorišten mora se odložiti i uništiti u skladu sa oldredbama Zakona o upravljanju otpadom („službene novine FBiH“ broj 33/03)

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-772/16 J.B.; 24.06.2016..

PROIZVOĐAČ: Filozoo Srl ; Via Del Commercio 28-30 Carpi (Modena)

Tel: +39059637311.