



UltraChoice 8

SASTAV

1 doza (2ml) vakcine sadrži:

Clostridium chauvoei, C.septicum, C.haemoliticum, C. Novyi, C. Sardelli, C. Perfrigens tip C i D bakterin toxoid.

Nosača 2 ml

INDIKACIJE

Za uporabu kod zdravih goveda i ovcaca kao pomoć u prevenciji bolesti uzrokovanih Cl. chauvoei (šuštavac); Cl. septikum (maligni edem); Cl. haemolvticum (bacilarnu hemoglobinuria); Cl. novyi (crna bolest); Cl. sordellii (gasna gangrena), i Cl. perfringens tipa B, C i D (enterotoxemia i enteritis).

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Goveda: 2 ml vakcine potkožno nakon čega slijedi druga doza 4-6 sedmica kasnije.

Ovce: 1 ml vakcine potkožno u vrat, nakon čega slijedi druga doza 4-6 sedmica kasnije.

Dosjepljivanje jednom godišnje se preporučuje. Za Cl. Haemolyticum svakih 6 mjeseci.

KONTRAINDIKACIJE

Ne cijepiti životinje 21 dan prije klanja.

NUSPOJAVE

Privremene lokalne otekline na mjestu ubrizgavanja mogu se pojaviti nakon primjene vakcine. Izvještaji sa terena upućuju da se može desiti smanjenje mlijeka kod muznih grla.

KARENCA

Meso , organi i druga jestiva tkiva

Goveda i Ovce: 21 dan

NAČIN DRŽANJA

Vakcincu držati na temperaturi od 2-8°C, ne smije se zamrzavati.

ROK UPOTREBE

Označen je na ambalaži. Vakcina mora biti utrošena odmah nakon otvaranja.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se samo na veterinarski recept.

PAKOVANJE

Boce od 100 ml (50 doza za goveda ili 100 doza za ovce). 500 ml (250 doza za goveda ili 500 doza za ovce).

Sva pakovanja ne moraju biti dostupna na tržištu.

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-718-1/13 od 24.04.2013. godine

PROIZVODAČ

Zoetis Inc., USA

ZASTUPNIK

Expertus Solutio doo Sarajevo

Dobrinjska do br.27

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina