

UPUTSTVO ZA UPOTREBU NONOVULIN TABLETE ZA PSE I MAČKE

Sastav:

Aktivna tvar: 10 mg megestrol acetata

Pomoćne tvari: laktosa, maydis amyłum, povidon, talk, magnezij stearat, koloidalni anhidrovani silicijev dioksid

Indikacije:

Za blokiranje (prekid) i odgodu estrusa kod pasa i mačaka, smirenje seksualno uzbudjenih muških pasa i mačaka kao i promjena u ponašanju u vezi s tim (satiraza). Kod mačaka se preporučuje u slučajevima liječenja milijarnog ekcema.

Kontraindikacije:

Ne koristiti kod pasa i mačaka koji nisu postigli spolnu zrelost, ne koristiti kod gravidnih životinja, i u slučaju lažne-trudnoće, kod pasa i mačaka sa ginekološkim poremećajima na hormonalnoj bazi, i u slučaju ginekoloških infekcija.

Nije preporučen za upotrebu kod gravidnih kuja i mačaka.

Neželjene nuspojave:

Ponekad je moguće nastajanje povraćanja, gubitak apetita, apatija, pojava laktacije, slučajevi endometritisa i piometre, cistozna hiperplazija endometriuma, izazivanje ili pogoršanje dijabetesa melitusa, fibrocistična degeneracija i tumor mlijecne žljezde. Ako se koristi duži vremenski period u visokim dozama moguća je apatija i debljanje kod tretiranih pasa i mačaka, granulocistične hiperplazije endometrijuma, fibrocistična degeneracija i mamarni tumori, metritis i piometra.

Kod mladih životinja koje nisu dostigle spolnu zrelost, nedostatak spolnog ciklusa i neplodnosti se često pojavljuju.

U slučaju prekida liječenja sa preporučenim dozama, primjećena je nepravilnosti u seksualnom ciklusu.

Ciljane vrste životinja:

Psi i mačke

Doziranje za svaku životinsku vrstu , i način davanja:

Primjenjuje se oralno u sljedećim dozama, ovisno o životinskoj vrsti :

Psi :

-prekid estrusa - 1 - 2 mg / kg tjelesne mase (u prosjeku 1,5 mg / kg tjelesne mase) tokom 3 dana , s početkom u trenutku prvi znakova estrusa (oticanje stidnice, pojava krvavih flokula u estrusnoj sekreciji) i 0,5 do 1 mg / kg tjelesne mase u sljedećih 7 dana (1-2 tablete dnevno u prva 3 dana i 1 /2 - 1 tableta u sljedećih 7 dana) ;

-odgoda (privremeno odgadjanje) estrusa (u slučaju prevoza, sudjelovanje na izložbama i natjecanjima, itd.) – po 0,5 mg / kg tjelesne mase na dan, liječenje počinje 7 dana prije očekivanog estrusa i traje onoliko dugo koliko je kašnjenje estrusa potrebno (najmanje 14 dana). Ako je potrebno produženje učinka, nakon 10 dana postupak se može ponoviti . Procedura može biti primjenjena samo jednom u 6 mjeseci .

U slučaju seksualno uzbudjenih muških pasa (satiraza) sa ili bez agresivnosti ili drugim promjenama u ponašanju , iste doze koriste se kao i za prestanak spolnog ciklusa u ženki .

Mačke :

-prekid estrusa - 5 mg / mačka (1/2 tablete) na dan , za 8 uzastopnih dana , počevši od trenutka prvi znakova estrusa , -odgoda estrusa - 2,5 mg / mačka (1/4 tablete) 3 puta sedmično tokom cijelog estralnog razdoblja ,

-u slučaju satiraze kod mužjaka - 2 mg / kg tjelesne mase na dan tijekom 30 dana (do nestanka znakova) .

Savjeti za pravilnu primjenu:

Unutrašnja, oralna

Za upotrebu na životinjama.

Karenca :

Nema

Poštivanje karantinskog period se ne zahtjeva kod upotrebe Nonovulina kod pasa i mačaka.

Specijalni uslovi za čuvanje proizvoda:

Držati van dosega djece.

Čuvati na temperaturi od 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvati na suhom mjestu.

Čuvati dalje od sunčevih zraka.

Ne koristit nakon isteka roka trajanja, naznačenog na vrhu pakovanja

Specijalna upozorenja:

Nema

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom.

(Zakon u opravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Način izdavanja: na recept

Pakovanje: kutija od 30 tableta

Proizvodač: Golashpharma Ltd Bulgaria , Sapareva Bana, ul.Pobeda 33, obl.Konstendil, Bugarska. tel:+359 888 300 755

Uvoznik za BiH:

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica , Bosna i Hercegovina

tel: 032/423-196; fax: 032/423-194

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-24/17-510/14 od 31.03.2014.