

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PANVERMIN 300MG BOLUSI

Sastav:

Albendasole 300mg ;

Pomoćne tvari: laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, povidon, magnezijev stearat, koloidalni silicijev dioksid (Aerosol 200).

Djelovanje:

Albendazol je jedan od najaktivnijih antihelmintika širokog spektra iz skupine benzimidazola. Aktivan je protiv gastrointestinalnih i plućnih nematoda (*Haemonchus*, *Chabertia*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Bunostomum*, *Nematodirus*, *Oesophagostomum*, *Strongyloides*, *Dictyocaulus filaria*, *Dictyocaulus viviparus*, *Protostrongylus*) nematoda i cestoda (*Moniezia expansa*, *Moniezia benedeni*, *Theseneria* spp kod malih preživara. Albendazol djeluje protiv larvi i zrelih oblika trematoda.

U nematoda i fasciola ima također ovocidalnu akciju.

Indikacije:

Za terapijsko i profilaktičko čišćenje želučano-crijevnih i plućnih nematoda, anaplocefala (*moniezia*, *thysaniezia*), fascioleze i dicrocilioze u goveda, ovaca i koza.

Kontraindikacije:

Ne preporučuje se tijekom perioda osjemenjavanja i u prvom mjesecu graviditeta. Ne koristiti u toku laktacije ovaca i koza.

Interakcije sa drugim veterinarsko medicinskim proizvodima:

Nisu primjećene fizičko-hemijske ili farmako-toksikološke inkompatibilnosti sa drugim medicinskim proizvodima ili druge forme interakcija.

Neželjene reakcije:

U terapijskim dozama Panvermin se dobro podnosi, i ne uzrokuje neželjene reakcije.

Kod ovaca nema neželjenih učinaka čak i nakon 5-10 puta većeg doziranja – prekoračenje doze od 37,5 mg / kg tjelesne težine.

Davanje u visokim dozama (53 mg / kg tjelesne težine) može dovesti do prolaznog gubitka apetita.

Primjenjuje tokom osjemenjavanja i prve 3 sedmice graviditeta može uzrokovati teratogeni učinak.

Administracija tokom graviditeta i laktacije:

Koristiti samo nakon prvih mjeseci graviditeta.

Ne koristiti kod ovaca i koza tokom laktacionog perioda.

Predoziranje:

Kod ovaca nema neželjenih učinaka čak i nakon 5-10 puta većeg doziranja - 37,5 mg / kg tjelesne težine. Davanje u visokim dozama (53 mg / kg tjelesne težine) može dovesti do prolaznog gubitka apetita, da bi se izbjegle ovakve reakcije preporuka je uskratiti vodu životinjama 5-6 sati nakon aplikacije.

Ciljane životinje:

Goveda, ovce, koze.

Specijalna upozorenja kod upotrebe, uključujući i upozorenja vezana za ljude koji apliciraju preparat:

Nije potrebna specijalna dijeta prije i nakon administracije. Da bi se dostigla visoka efektivnost neophodno je slijediti instrukcije za doziranje i upotrebu- oralna i pojedinačna doza za svaku životinju. Kao i kod drugih antihelmintika, odrediti tačnu preporučenu dozu i pravilno primjeniti proizvod uz pomoć veterinaru da bi obezbijedili adekvatnu kontrolu parazita . Tokom korištenja osobe koje apliciraju lijek trebaju izbjegavati kontakt sa vodom, hranom i pušenje. Nakon upotrebe oprati ruke.

Doziranje:

Aplicira se oralno, direktno i individualno za svaku životinju.

Za liječenje: gastrointestinalnih i pulmonalnih nematoda i tenia- 1 bolus na 50 - 60 kg tjelesne mase (5-6 mg / kg tjelesne težine od aktivne tvari), za liječenje kronične fascioleze - 1 bolus 40 kg tjelesne težine (7, 5 mg / kg tjelesne težine), za liječenje dicrocilioze - 2 bolusa za 40 kg tjelesne težine (15 mg / kg tjelesne težine).

Karenca:

Za meso - 10 dana

Životinje koje su namijenjene za prehranu ljudi ne smiju biti klane tijekom liječenja. Životinje mogu biti zaklane za prehranu ljudi deset dana nakon zadnjeg tretmana.

Za mlijeko - 5 dana

Korištenje proizvoda preporučuje se tijekom sušnog /bezlaktacionog razdoblja.

Ne konzumirati mlijeko tijekom liječenja s albendazolom. Korištenje se preporučuje pet dana nakon posljednjeg tretmana.

Način čuvanja:

Na suhom i od sunca zaštićenom mjestu na temperaturi do 25°C.

Držati van doseg a djece.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišten i veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon u opravljaju otpadom SI.novine FBiH br.33/03)

Način izdavanja: na recept

Pakovanje: kutija 30 bolusa

Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

Proizvođač: Golashpharma Ltd Bulgaria , Sapareva Bana, ul.Pobeda 33, obl.Konstendil, Bugarska. tel: +359 888 300 755

Uvoznik za BiH:

Bosna Vet doo Zenica, Gorazhdanska 36a, 72000 Zenica , Bosna i Hercegovina
tel: 032/423-196; fax: 032/423-194

Broj i datum odobrenja : UP-I-06-2-24/17-509-1/14 od 31.03.2014.