

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO

za upotrebu u veterinarstvu

1000 doza – 500 ml

FARMACEUTSKI OBLIK : inaktivirana uljna vakcina

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 doza inaktivirane vakcine sadrži minimalno $10^{6.2}$ TCID₅₀ IBD virusa, soj Baxendale;

$10^{7.7}$ EID₅₀ ND virusa B1 tip, soj LaSota; $10^{6.9}$ EID₅₀ IB Massachusetch tip, soj Dg;

$10^{5.8}$ TCID₅₀ ptičijeg reovirusa soj 1799 i $10^{6.3}$ TCID₅₀ ptičijeg reovirusa soj S1133.

Sistem uzgoja: SPF kokošiji embrio

DJELOVANJE: Vakcina je vlastiti proizvod proizvođača koji nakon odgovarajuće primjene u odgovarajućoj dozi kod vakcinisanih teških reproduktivnih (roditeljskih) pilenki i nesilica stimulira razvoj vakcinalnih antitijela protiv virusa Njukaslske bolesti i infektivnog bronhitisa Massachusetch tip, te maternalnih antitijela kod pilića potomakaza prevenciju infekcija virusima uzročnicima infektivnog burzitisa (Gumboro bolest) i reovirusa malapsorpcije uključujući i tenosinovitis.

INDIKACIJE: za aktivnu imunizaciju teških reproduktivnih (roditeljskih) pilenki i nesilica protiv infektivnog bronhitisa, Infektivne burzalne bolesti, Newcastle bolesti, Virusnog artritisa i tenosinovitisa.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Vakcina prije upotrebe treba biti zagrijana na sobnu temperaturu. Prije upotrebe dobro promiješati. Ubrizgati sub kutano koristeći aspetičnu tehniku. Nakon prvog otvaranja iskoristiti cijeli sadržaj boce. Vakcinisati sa živom Newcastle-Bronhitis vakcinom Massachusetch tip, živom vakcinom infektivne burzine bolesti i i živom tenosinovitis vakcinom najmanje 4 sedmice prije upotrebe ove vakcine. Vakcinisati jedinke u dobi između 16 i 20 sedmica starosti. Revakcinisati u vrijeme mitarenja ukoliko se radi o daljnjoj eksploataciji jedinki i planiranju držanja jedinki za drugi proizvodni ciklus.

APLIKACIJA I DOZE : Doza: ½ ml (0.5 ml) po jedinki. Vakcinisati sve jedinke u jatu.

Preporučuje se za vakcinaciju roditelja teških linija u uzgoju i za zamjenske mlade kokice kao pomoć u preventivi Newcastle bolesti i infektivnog bronhitisa (Massachusetch tip) i za stvaranje maternalnih antitijela kao pomoć u preventivi infektivne burzine bolesti i reovirusnih malapsorpcija i tenosinovitisa kod potomstva.

Administracija: intramuskularna u prsnu muskulaturu ili subkutano u vrat.

ŠTETNI I NEŽELJENI EFEKTI: Nisu registrirani, niti su opisani štetni i neželjeni učinci nakon upotrebe vakcine.

KARANCA: Nema indikacija za određivanje karence. Nije potrebna.

NAPOMENA: Čuvati na temperaturi 2-7 °C. Ne zamrzavati!

UPOZORENJE: U slučaju aplikacije vakcine ljudima zatražiti hitni medicinski nadzor! Ne vakcinisati jedinke unutar 42 dana prije klanja.

ROK UPOTREBE: Označen je na pakovanju.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se na recept.

PAKOVANJE: boca 500ML/1000 doza

BROJ I DATUM RJEŠENJA: UP-I-06-2-24/17-516-1/13 od 03.04.2013

PROIZVOĐAČ: Lohmann Animal Health International 375 China Road, Winslow, Maine 04901, USA

ZASTUPNIK: BOSNA VET doo Goraždanska 36A, ZENICA, B I H tel: +38732423196; fax: +38732423194