



Versifel FeLV

Injekcijska suspenzija za mačke

SASTAV

Svaki 1mL doze Versifel FeLV sadrži:

Aktivna tvar:

Inaktiviran virus mačije leukemije (FeLV) subtip A,B i C (Kawakami – Theilen soj)

uključujući gp 70 subjedinicu – antigen

indukujući gp 70 antitijela GMT $\geq 8,1 \log 2^*$

*determinisan mišijim potenci testom (anti gp70 antijela)

GMT – geometrijska sredina titra

Pomoćne tvari:

Soli

Voda za injiciranje

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju osjetljivih mačaka od 9 nedjelja starosti u cilju redukovanja borija mačaka inficiranih sa FeLV virusom. Početak imuniteta se pojavljuje u roku od 4 nedjelje od završenog prvobitnog vakcinisanja. Ne postoje podaci o zaštiti životinja pri pojavi bolesti, ali prevencija od infekcije je povezana sa zaštitom od pojave oboljenja. Imunitet traje najmanje godinu dana nakon prve vakcinacije, a tri godine nakon buster vakcinacije (doza za revakcinaciju).

OBLIK

Vakcina

KONTRAINDIKACIJE

Ne postoje

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Injicira se subkutano

Protresti bočicu i što prije injicirati.

Primarna vakcinacija:

Vakcinisati mačku sa 8 sedmica starosti, nakon 3-5 sedmica aplicirati drugu dozu.

Revakcinacija:

Godišnje jednom.

NUSPOJAVE

Nakon prve potkožne primjene kod ciljanih vrsta dešava se prolazi porast tjelesne temperature (često do 40°C), temperatura u roku do 48 sati opada.

Uz povećanje temperature, nakon primjene vakcine može se pojaviti i mala potkožna oteklina (promjer obično manji od 10mm, maksimalnog promjera 20mm). Većina tih oteklina nestaje najkasnije za dvije sedmice.

Nakon druge doze dešava se prolazno povećanje preskapularnih limfnih čvorova, česti su i male su veličine (promjera (0,5cm), koje otkrivamo tek nakon palpacije. Obično se rješava u roku od 24 sata, zdravlje životinja nije ugroženo.

U slučaju anafilaktičkog šoka treba primijeniti odgovarajući tretman.

NAPOMENA

Postoje podaci o sigurnosti i učinkovitosti ovog cjepiva pomješanog s Versifel CVR i primjenom na jedno mjesto ili davati istog dana zajedno sa Versifel CVR ali na različitom mjestu.

Nema podataka o trajanju imuniteta kada se primjenjuje zajedno sa Versifel CVR, to treba uzeti u obzir pri razmatranju intervala ponovnog cijepljenja.

Nema dostupnih informacija o sigurnosti i učinkovitosti cijepljenja kada se koristi s bilo kojim drugim veterinarskim lijekom osim gore navedenim.

KARENCA

Nema

NAČIN ČUVANJA

Na tamnome mjestu, pri temperaturi od 2-8°C. Pripravak se ne smije zamrznuti.

NAČIN IZDAVANJA

Lijek se izdaje na veterinarski recept.

ROK UPOTREBE

Označen je na ambalaži, u trajanju od 2 godine. Načetu bočicu treba utrošiti odmah.

PAKOVANJE

Staklena bočica Tip I sa pojedinačnom dozom, providna plastična kutija sa 25 x 1ml (1doza).

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-221/15 od 18. marta 2015. godine

PROIZVOĐAČ

Zoetis Belgium S.A.

Rue Laid Burniat 1

Louvain-la-Neuve B-1348

Belgija

ZASTUPNIK

Expertus-Solutio doo Sarajevo

Dobrinjska do br. 27

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina