

VILANOV Injekciona Otopina

Veterinarski nesteroidni protuupalni

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV:

VILANOV Injekciona topina, karakterističnog mirisa, bezbojna , prozirna , sterilna otopina u svakom mililitru sadrži 500 mg metamizol natrija (metilamino-dimetil-fenil metil pirazon sulfonat natrijeve soli).

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

VILANOV Injekciona topina, u sebi sadržava metamizol analgetike, antipiretike , spazmolitike koji imaju jaka protivupalna dejstva. Metamizol je skupina spojeva pirazona. Djeluju kao analgetici, protivupalno i antipiretički te blokiraju sintezu prostaglandina. Imaju također antispazmoličko dejstvo na mišiće. Smanjuju peristaltiku i regulatorno djeluju. Antipiretičkim djelovanjem na autonomni živčani sistem proširuju periferne arterije te dovode do smanjenja temperature. Na upalnim područjima smanjuju vaskularne propusnosti, povećavanjem apsorpcije tekućine i ima antireumatsko dejstvo te tako pomažu u liječenju mnogih bolesti. Parenteralnom primjenom se brzo apsorbira. Glavni metaboliti na samom vrhu su 4-metilaminofenazon, 4-formilaminofenazon te se povrate u 4-asetilaminofenazon. Maksimalna koncentracija u plazmi i tkivima se postiže u roku od pola sata. Metabolitički poluživot u plazmi je u rasponu od 3 do 10 sati. Brzo prodire u tkiva sa tjelesnom tekućinom i centralni nervni sistem. Iz tijela se izlučuje putem urina.

PODRUČJE UPOTREBE / INDIKACIJE

VILANOV Injekciona topina, se upotrebljava analgetički ,antipiretički i antireumatski kod konja,goveda i pasa.

Konkretno:

Lijek ima analgetičko, antipiretičko i antireumatsko djelovanje kod konja, goveda i pasa. Konkretno lijek djeluje na: bolove mišićnog ili nervnog porijekla (miozitis, neuralgije, neuritis), reumatski bolovi, akutni i hronični poliartritis, tendinitis i bolovi tendovaginitisa. Zatim grčevi u probavnom traktu (crijeva i jednjaka), a posebno u slučajevima spaza i tjeskobe maternice, prolapsusa maternice, te bolnih hirurških zahvata.

DOZIRANJE I PRIMJENA

VILANOV Injekciona topina , kod konja,goveda i pasa se tretira intravenski i intramuskularno.

Farmakološka doza :Konji 20-60 mg metamizola / kg žive vage/dnevno , goveda 20-40 mg metamizola/kg žive vage/dnevno, svinje 15-50 mg metamizola /kg žive vage , psi 50-100 mg metamizola/kg žive vage /dnevno.

Praktična doza:

Konj : 8 ml/100 kg žive vage

Ždrijebe : 4 ml/50 kg žive vage

Govedo : 6 ml/100 kg žive vage

Tele:3 ml/50 kg žive vage

Pas: 1.5 ml/10 kg žive vage izračunato u dozama.

VILANOV Injekciona topina , po potrebi tretirati dva puta dnevno sa pauzom od 8 sati.

POSEBNA KLINIČKA UPOZORENJA ZA TRETIRANJE CILJANIH VRSTA

Kod trkaćih konja , ne treba tretirati 5 dana prije i 5 dana poslije utrke.

Ne preporučuje se tretiranje mačaka zbog moguće pojave razdražljivosti i slinjenja.

Upotreba u gestaciji: Može dospjeti u posteljicu te izazvati respiratornu depresiju fetusa.

NEŽELJENI EFEKTI

Dugotrajna upotreba metamizola može izazvati leukopeniju i agranulocitozu. Ne treba tretirati životinje koje imaju zdravstvene probleme koštane srži i kod životinja sa problemima krvi. Vršiti pritisak na protrombinsko oblikovanje, te može povećati tendenciju krvarenja tijekom tretiranja. Može prozrokovati egziz, pospanost, razdražljivost, krv u mokrenju,poremećaj u hodu i serumsku bolest zbog preosjetljivosti, upalu ulkusa usta,upalu bubrega ili jetre. U slučajevima preosjetljivosti se mogu pojaviti osipi i urtikarije. Na mjestu tretiranja mogu se pojaviti upale i prolazne otekline. U tim slučajevima upotrijebiti toplu masazu. O svim neželjenim efektima koji nisu naznačeni u ovom Uputstvu potrebno je odmah obavjestiti nadležnog veterinaru u skladu sa članom 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju uveterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" broj 15/98 i 70/08)

SIMPTOMI PREDOZIRANJA , MJERE I OPREZI

Može se primijetiti izraziti pritisak na koštano srž i naglo opadanje krvnog pritiska, koma, šok i konvulzija.

U tim slučajevima se primjenjuje simptomatsko liječenje.

INTERAKCIJE LIJEKOVA

Kada se koristi s klorpromazinom može dovesti do hipotermije . Ne treba primjenjivati zajedno sa salicilnom kiselinom. Ne treba se koristiti zajedno s fenilbutazonom i barbituratom.

UPOZORENJA O OSTATKU LIJEKOVA U HRANI

Karenca : Meso i organi goveda - 12 dana od zadnje terapije.

Ne koristiti kod krava čije mlijeko se upotrebljava za ljudsku ishranu.

Ne koristi se kod konja čije se meso i mlijeko upotrebljavaju u ishrani ljudi.

KONTRAINDIKACIJE

Ne treba koristiti kod životinja koje imaju hematopoetski sistem bolesti, koje imaju kronične gastrointestinalne čireve, koje imaju bolesti srca, bubrega i jetre te kod životinja sa povišenim krvnim pritiskom.

OPĆE NAPOMENE

Molimo kontaktirajte svog veterinara ako primijetite neočekivane posljedice.

Čuvajte podalje od djece.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

Osobe preosjetljive na Metamizol trebaju izbjegavati dodir sa lijekom , u slučaju dodira , ruke dobro isprati sa vodom.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja lijeka je 24 mjeseca od datuma proizvodnje .Čuvati na sobnoj temperaturi .

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ili OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03):

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-46/19 J.B; od 20.03.2019.godine

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na recept.

PAKOVANJE

Pakovano u žuto obojene staklene flašice u kutijama u pakovanju od 20 ml, 50 ml i 100 ml.

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Koy İci Kümeevleri No: 765A, Akyurt / ANKARA / TURKEY

UVOZNIK i ZASTUPNIK ZA BiH

„Terravet" doo Gradacac, Sarajevska bb, 76250 Gradacac, Bosna i Hercegovina