

UPUTSTVO ZA PRIMJENU

1. IME LIJEKA

VITAMIN AD3EC

Emulzija za peroralnu upotrebu

Preživači, konji, svinje, perad, kunići, krvnaci i golubovi

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml emulzije sadrži:

Aktivna supstanca:

Vitamin A (retinol palmitat)

50 000 i.j.

Vitamin D (kolekalciferol)

5 000 i.j.

Vitamin E (α -tokoferol acetat)

30 mg

Vitamin C (askorbinska kiselina)

100 mg

3. NAZIV I ADRESA PROIZVODAČA

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

4. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 125A, 71 000 Sarajevo

5. INDIKACIJE

- Poticanje rasta i proizvodnosti.
- Povećanje otpornosti na infekcije.
- Poboljšanje opštег stanja zdravlja.
- Smanjenje posljedica stresa pri prevozu, promjeni smještaja i hrane i dr.
- Sprječavanje nestašice vitamina i liječenje životinja oboljelih od rahitisa, miopatije, nutritivnog steriliteta, osteomalacije te u razdoblju rekonvalescencije.
- Poremećaji u hranidbi.

6. KONTRAINDIKACIJE

Kontraindicirana je primjena vitamina A, D ili E u okolnostima hipervitaminoze, a što je u praksi gotovo nepoznato.

7. NUSPOJAVE

Nisu poznate.

8. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Preživači, konji, svinje, perad, kunići, krvnaci i golubovi

9. DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Vrsta i kategorija životinje	Doza
Telad i ždrebadi	10 ml/životinja
Konji i govedo	20 ml/životinja
Rasplodne svinje i nerasti	10 ml/životinja
Svinja 50-100 kg	4-8 ml/životinja
Ovca i koza	5 ml/životinja
Prasad na sisi i odbita prasad	2-4 ml/životinja
Janjad i jarad	2.5 ml/životinja
Kunići, nerčevi i činčile	1-2 ml/životinja ili 200 ml/100 l vode
Pilići i purani do 4. tjedna	100 ml/2000 životinja ili 100 ml/100 l vode

Pilići i purani nakon 4. tjedna	100 ml/2000 životinja ili 100 ml/200 l vode
Pilenke	100 ml/1000 životinja ili 100 mL/100 l vode
Nesilice lakih pasmina	100 ml/800 životinja ili 100 ml/250 l vode
Nesilice teških pasmina	100 ml/800 životinja ili 100 ml/400 l vode
Golubovi	1 ml/12 životinja

10. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LIJEKA

Vitamin AD3EC daje se u vodi za piće, mlijecnom nadomjestku ili se pridoda tekućoj hrani tokom 3-5 uzastopnih dana. Vitamin AD3EC se dodaje u tekućinu koju će životinje popiti tokom 2 sata. Za vrijeme liječenja životinje ne smiju imati drugi izvor pitke vode.

11. KARENCA

Meso i jestive iznutrice: 0 dana
Mlijeko i jaja: 0 dana

12. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati pri temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svjetlosti.
Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

13. POSEBNA UPOZORENJA

Upotreba Vitamina AD3EC emulzije za peroralnu upotrebu se ne preporučuje za upotrebu kod životinja za vrijeme laktacije.
Budući da velike doze vitamina A mogu djelovati teratogeno, lijekove koji ih sadrže ne preporučuje se primjenjivati u takvim dozama neposredno prije pripusta te do kraja prve trećine gravidnosti.
Retinil smanjuje antiinflamotorni učinak glukokortikoida.
Barbiturati, aminopirin, antipirin, klorbutanol i benzoapiren i 3-metilkloatren stimuliraju sintezu vitamina C.

14. POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Neiskorišten lijek ili ostatak lijeka se uništavaju u skladu sa važećim propisima (Sl. novine FBiH 33/03-Zakon o upravljanju otpadom).

15. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

23.07.2014.

16. OSTALI PODACI

Broj dozvole za stavljanje u promet: UP-I-06-2-24/17-960/14 od 23.07.2014.

Način izdavanja: bez recepta

Rok upotrebe: 2 godine.

Pakovanje: bočice sa 100 mL i 1L emulzije.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

ATCvet kod: QA11JA