

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

WONDERCEF

Injekcioni rastvor za goveda i svinje Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV WONDERCEF 1 g:

Natrijum ceftiofur	1105 mg
--------------------	---------

(što odgovara ceftiofur)	1060 mg
--------------------------	---------

Nosač: sterilna voda za pripremu injekcionog rastvora do	20 ml
---	-------

1 ml injekcionog rastvora nakon pripreme, sadrži ceftiofura 50 mg

DJELOVANJE

Wondercef sterilni prah sadrži ceftiour, cefalosporin iz treće generacije. Lijek spada u grupaciju baktericida koji ima visok učinak protiv gram + i gram – bakterija. Ispoljava svoje baktericidno djelovanje na bakterije in vivo i in vitro i to na: *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Streptococcus suis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Fusobacterium necrophorum* e *Porphyromonas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*).

Ceftiofur se pokazao vrlo efikasan baktericid i in vitro, protiv gram + i gram – bakterija i to: *Actinomyces pyogenes*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus bovis*, *Klebsiella*, *Citrobacter*, *Enterobacter*, *Bacillus spp.* e *Proteus spp.*

INDIKACIJE

Wondercef se koristi u terapiji bakterijskih infekcija respiratornih organa kod goveda, svinja, kao i kod liječenja interdigitalne nekrobaciloze papaka goveda.

Kod liječenja, nakon aplikacije lijek se vrlo brzo apsorbira u organizmu životinje i postigne maksimalnu koncentraciju u plazmi krvi u roku od 30 minuta.

Upotreba ovog lijeka je na osnovu antibiograma, gdje je to moguće, ili na osnovu pažljivo postavljene dijagnoze (samo u veoma akutnim slučajevima). Ukoliko upotreba lijeka nije u skladu sa ovim Uputstvom ili se lijek često upotrebljava, vrlo brzo može doći do pojave širenja rezistencije mikroorganizama na ljude.

Ovaj lijek je isključivo namjenjen kod pojedinačnog liječenja životinja.

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne smije koristiti kod životija koje su alergične na cefalosporine.

Uočeni su prolazni simptomi bola na mjestu uboda.

Lijek se ne smije davati drugim vrstama životinja za koje nije namjenjen, posebno perad (nosilje), zbog rizika brzog širenja rezistentnih mikroorganizama na ljude.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Pripremiti otopinu Wondercef-a tako da se tekući sadržaj boćice prenese u bočicu sa prahom i potom dobro promućkati.

Proizvod se može aplicirati intramuskularno u sljedećim dozama:

Goveda:

Kod infekcija respiratornih organa koristi se u dozi od 1 ml / 50 kg žive mase dnevno (što odgovara 1 mg ceftiofur / 1 kg žive mase), tokom 3 – 5 dana.

Kod interdigitalne nekrobaciloze koristi se u dozi od 1 ml / 50 kg žive mase dnevno (što odgovara 1 mg ceftiofur / 1 kg žive mase), tokom 3 dana.

Svinje

Kod infekcija respiratornih organa koristi se u dozi od 1 ml / 16 kg žive mase dnevno (što odgovara 3 mg ceftiofur / 1 kg žive mase), tokom 3 dana.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

O svim negativnim reakcijama na primjenu lijeka odmah obavjestiti nadležni organ i predstavnika proizvođača.

INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Ceftiofur ne koristiti zajedno u liječenju sa makrolidima, sulfonamidima i tetraciklinima.

POSEBNE MJERE OPREZA ZA PRIMJENU KOD ŽIVOTINJA

Treba izbjegavati predoziranje i terapiju u previše kratkom roku ili nedovoljnem periodu, jer lijek može izazvati otpornost mikroorganizama na antibiotike.

Lokalna iritacija kože, posebno nakon čestog kontakta.

WONDERCEF odabire rezistentne sojeve bakterija, kao što su β – laktamaza nosači proširenog spektra (ESBL) i može predstavljati rizik za ljudsko zdravlje, ukoliko se ovo prenese na čovjeka, npr. preko hrane. Iz ovih razloga lijek mora biti ograničen na liječenje kliničkih stanja koji su odgovorili ili za koje se smatra da bi mogli odgovoriti na tretman u

prvom davanju (antibiogram). Češća upotreba, uključujući i upotrebu lijeka drugačije od načina upotrebe koji je naveden u ovom Uputstvu, može dovesti do povećanog broja i preimručstva otpornosti kod prisutnih mikroorganizama. Lijek je namjenjen liječenju pojedinačnih životinja. Proizvod se ne smije koristiti kod ponovljene bolesti ili kao dio zdravstvenog programa na farmi.

U slučaju graviditeta, lijek se koristi su skladu sa procjenom dobrobiti/rizika, koji određuje veterinar.

POSEBNE MJERE OPREZA KOD OSOBA KOJE PRIMJENJUJU LIJEK

Osobe koje su preosjetljive na cefalosporine ili peniciline moraju izbjegavati kontakt sa lijekom. U slučaju nehotičnog samoinjektiranja, odmah kontaktirati ljekara i ponijeti uputstvo ovog lijeka na pokaz. Obavezno nositi zaštitne rukavice.

KARENCA

Goveda:

- Meso i iznutrice: 24 sata (1 dan)
- Mlijeko: 0 dana

Svinje:

- Meso i iznutrice: 48 sati

NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Lijek se čuva isključivo u frižderu na temperaturi od 2 – 8^o C.

Držati dalje od dohvata djece.

ROK UPOTREBE

2 godine za aktivnu supstancu – ceftiofur

4 godine za rastvarač.

Nakon rastvaranja lijeka, lijek treba iskoristiti u roku od 12 sati, ako se drži na temperaturi od 15-30^o C, a 7 dana ako se drži na temperaturi od 2 – 8^o C u frižderu.

PAKOVANJE

Prašak: 1 g ceftiofura

Rastvarač: 20 ml

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA

Bilo koji neupotrijebjeni lijek ili otpadni materijali dobiveni primjenom tog lijeka treba se odlagati u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ 33/03).

BROJ I DATUM RJEŠENJA: UP-I-06-2-24/17-1403/17 J.B, od 16. novembra 2017. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a**, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy
– Casella Postale/P.O. box 2

UVODNIK I DISTRIBUTER:

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. *Orašje*, VIII ulica br. 57, 76270 Orašje, BiH
Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: info@sintofarm-adriatica.com