

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BIHELDON

TABLETE ZA PSE I MAČKE

Sastav:

Praziquantel 50mg , Pyrantel Pamoat 150mg.

Pomoćne tvari: Lactoza, amyrum triticum, povidon, talk, magnezijum stearat do 600mg.

Djelovanje:

Kombinirani pripravak istovremeno djelovanje na spolno zrele i spolno nezrele oblike trakovica (Praziquantelum) i glista (Pyranteli pamoat), koje žive i parazitiraju u probavnom traktu kod pasa i mačaka.

Indikacije:

Za liječenje i prevenciju cestoda (uzrokovane sa Echinococcus granulosum, E. multilocularis, Taenia multiceps, T. ovis, T. pisiformis, T. taeniaeformis, T. hidatigena, Dipilidium caninum, Diphyllobothrium erinacei, Mesocestoides Corti) kao i oblika nematoda (uzokovanih sa Toxocara canis, T. cati, Toxascara Leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum) kod pasa i mačaka.

Može se koristiti kod gravidnih kuja i mačaka kao i u laktaciji.

Sa upotrebotom Biheldona tableta se postiže puna dehelmintacija pasa i mačaka

Kontraindikacije:

Nisu poznate za administraciju Biheldona kod pasa i mačaka.

Postoje neke preporuke da se Praziquantel ne daje psima mlađim od 4 sedmice i mačkama ispod 6 sedmica starosti (ova preporuka ide zbog nemogućnosti infestacije mlađih sa teniom, te nema toksikološkog rizmatranja).

Nema kontraindikacija za upotrebu tokom graviditeta i laktacije.

Neželjene reakcije:

Veoma rijetko administracija praziquantela može biti praćena povraćanjem, gubitkom apetita i proljevom kod pasa i mačaka, ali bez ozbiljnih posljedica.

Psi podnose pyrantel pamoate veoma dobro, i nakon višestrukog doziranja, te nema neželjenih sporednih efekata. Sigurnosni indeks (omjer između minimalne toksične i terapeutske doze) praziquantela i pyrantel pamoata kod pasa i mačaka je veoma visok i ne dolazi do predoziranja. Povraćanje je zabilježeno kod veoma visokih doza (preko 30 puta većim kod pasa i 10-20 puta većim kod mačaka od terapijskih). Nema zabilježenih smrtnih slučajeva kod pasa i mačaka nakon upotrebe praziquantela i pyrantel pamoata.

Ciljane životinje:

Psi i mačke

Doziranje:

Daje se oralno i direktno u dozi od 1 tablete na 10 kg tj.mase. (50mg/kg praziquantela i 150mg/kg pyrantel pamoata)

Pravilna administracija:

Oralnim putem.

Za upotrebu na životinjama.

Karenca:

Nema.

Specijalni uslovi za čuvanje:

Držati van doseg djece.

Čuvati na temperaturi od 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju.

Čuvati na suhom mjestu.

Čuvati dalje od sunčevih zraka.

Ne koristit nakon isteka roka trajanja, naznačenog na vrhu pakovanja.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon u opravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Način izdavanja: bez recepta

Pakovanje: kutija 50 tableta

Proizvodač: Golashpharma Ltd Bulgaria , Sapareva Bana, ul.Pobeda 33, obl.Konstendil, Bugarska.
tel:+359 888 300 755

Uvoznik za BiH:

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica , Bosna i Hercegovina
tel: 032/423-196; fax: 032/423-194

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-24/17-508/14 od 31.03.2014.