

---

**PRIJEDLOG UPUTSTVA ZA LIJEK**

---

## NAZIV

CattleMaster 4  
Suspenzija za injekciju  
za goveda  
za upotrebu u veterinarstvu

## SASTAV:

1 doza (2 mL ) sadrži:

### Aktivne supstance:

#### Liofilizovana frakcija:

- Virus infektivnog goveđeg rinotraheitisa (IBR), modifikovani živi termosenzitivni soj RLB 106: minimalni titar  $10^{5,7}$  CCID<sub>50</sub>
- Virus goveđe parainfluence 3 (PI3), modifikovani živi termosenzitivni soj RLB 103: minimalni titar  $10^{5,0}$  CCID<sub>50</sub>
- Goveđi respiratorni sincicijalni virus (BRSV), modifikovani živi soj BRSV/375: minimalni titar  $10^{4,1}$  CCID<sub>50</sub>

#### Tečna frakcija:

- Virus goveđe virusne dijareje (BVD), citopatogeni soj 5960: najmanje 0,31 ml
- Virus goveđe virusne dijareje (BVD), necitopatogeni soj 6309: najmanje 0,62 ml

**Adjuvans:** Suspenzija aluminijum hidroksida (Alyhydrogel) 0,4 ml

**Konzervans:** Tiomersal maks. 0,2 mg

**Pomoćne materije:** q.s. 2 ml

## INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju zdravih goveda ,bez obzira na starost ,u cilju smanjivanja mortaliteta izazvanog virusom infektivnog goveđeg rinotraheitisa (IBR, često poznat kao BHV-1), virusom parainfluence tipa 3 (PI3), goveđim respiratornim sincicijalnim virusom (BRSV) i virusom goveđe virusne dijareje (BVDV).

## KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate

## NEŽELJENE REAKCIJE

U slučaju reakcija preosjetljivosti, primeniti epinefrin ili slične preparate.

Ako opazite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, obavestite vašeg veterinara.

## CILJANE VRSTE :

Goveda

## DOZIRANJE ZA SVAKU VRSTU, NAČIN I METOD ADMINISTRACIJE:

Doziranje i način primene:

---

Rekonstituisati vakcinu tako što se prvo protrese bočica sa tečnom frakcijom. Primenom aseptične tehnike izvući sadržaj i dodati ga u bočicu koja sadrži liofilizat. Dobro protresti pre upotrebe.

Rekonstituisano cjevivo se primenjuje intramuskularnim putem u dozi od 2 ml po životinji..

Program vakcinacije:

a) Za goveda mlađa od 4 meseca starosti:

Dve doze od 2 ml rekonstituisane vakcine treba dati u razmaku od 14-28 dana. Uticaj antitela dobijenih od majke nije detaljno ispitivan te se stoga preporučuje da se telad cijepljena pre 12. nedjelje starosti ponovo cijepi u 12. nedjelji života.

a) Za goveda starija od 4 meseca starosti:

Dve doze od 2 ml rekonstituisane vakcine treba dati u razmaku od 14-28 dana.

**SAVJET O ISPRAVNOJ ADMINISTRACIJI:**

Cijepiti samo zdrave životinje. Efikasnost cijepjenja može biti umanjena kod životinja koje imaju kliničke simptome ili oboljenja u periodu inkubacije, imaju parazite ili su izložene stresnim situacijama.

**KARENCA:**

„0“ dana

**SPECIJALNA UPOZORENJA ZA SKLADIŠTENJE :**

Čuvati i transportovati na temperaturi 2 °C – 8 °C, zaštićeno od svetlosti.

Ne zamrzavati

Rok upotrebe : 18 meseci liofilizirana frakcija,

24 meseca ,tečna frakcija

Rok upotrebe nakon resuspendiranja :12 časova

**SPECIJALNA UPOZORENJA ZA SVAKU CILJANU VRSTU**

Cijepiti samo zdrave životinje. Efikasnost cijepjenja može biti umanjena kod životinja koje imaju kliničke simptome ili oboljenja u periodu inkubacije, imaju parazite ili su izložene stresnim situacijama.

Ne čistiti špriceve pomoću organskih sredstava za dezinfekciju.

Cijepivo , nakon rekonstitucije, ne treba čuvati duže od 12 časova.

Aplicirati isključivo intramuskularno.

**Specijalna upozorenja koja trebaju poštovati osobe koje administriraju veterinarski proizvod životinjama:**

U slučaju samoubrizgavanja vakcine , odmah potražite savjet ljekara i pokažite mu uputstvo za lijek ili tekst etikete.

**Korištenje tokom graviditeta, laktacije, nošenja**

Može se koristiti tokom graviditeta.

**Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugim oblicima**

---

### **Interakcije**

Nisu dostupne informacije o bezbednosti i efikasnosti prilikom istovremene primene ove vakcine i bilo koje druge.

### **Predoziranje (simptomi, postupci u slučaju nepredvidjenih situacija , protivotrovi), u slučaju potrebe**

Studije o bezbednosti koje su izvršene sa dvostrukom dozom vakcine su potvrdile da se vakcina dobro podnosi kod životinja svih starosti.

### **Inkompatibilnost**

U nedostatku ispitivanja, ne preporučuje se istovremeno apliciranje sa drugim preparatima.

### **Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal, ako ih ima:**

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom. (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

### **PAKOVANJE:**

Kartonska kutija sa 1 staklenom bočicom koja sadrži 5 ili 25 doza liofilizata, I  
1 staklenom bočicom koja sadrži 5 (10 ml) ili 25 doza (50 ml) suspenzije.

### **NAČIN IZDAVANJA :**

Izdaje se na veterinarski recept

**BROJ I DATUM ODOBRENJA:**UP-I-06-2-24/17-682/17 J.B., od 30. oktobra 2017. godine

### **PROIZVODJAČ**

Zoetis Belgium S.A.  
Rue Laid Burniat, 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
Belgija  
&  
Zoetis Inc.  
601 W. Cornhusker HWY  
Lincoln NE 68521, USA

### **ZASTUPNIK:**

„HEAD HUNTER“ d.o.o. Sarajevo  
Fra Anđela Zvizdovića br.1, Sarajevo  
71000 SARAJEVO  
BOSNA I HERCEGOVINA

