

Prijedlog uputstva za upotrebu

CHRONOGEST CR, kutija sa 1x25 vaginalnih spužvica

(za primjenu na životinjama)

Proizvođač: Intervet Productions, Francuska
Adresa: Rue De Lyons, Igoville.
Podnosilac zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH
Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

IME LIJEKA

Chronogest CR

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka spužvica od poliester-poliuretana sadrži:

- aktivne supstance: Hronolon (Flugeston acetat), 20 mg
- ekscipijenasa: Hidroksipropil celuloza 20 mg; Polietilen glikol 20 mg.

DJELOVANJE

Chronogest CR sadrži hronolon kao aktivni sastojak. Hronolon je sintetski progestagen. Način djelovanja hronolona je putem vezivanja na progesteronske receptore i smatra se da hronolon djeluje snažnije od progesterona. Hronolon se dobro resorbuje tokom perioda od 11-14 dana intravaginalne primjene. Stanje uravnotežene koncentracije postiže se ubrzo nakon početka tretmana.

Koncentracija hronolona u plazmi je relativno konstantna do otprilike 9. dana, a potom opada. Nakon uklanjanja Chronogest CR spužvice, koncentracija hronolona u plazmi spušta se ispod 0.78 pg/mL (LOD - granica detekcije). Koncentracija hronolona u plazmi dovoljna je da spriječi ovulaciju dok je spužvica u vagini, te da brzo inducira i sinhronizuje reproduktivni ciklus, neposredno po njenom vađenju. Ovo se dešava kao rezultat činjenice da koncentracija u plazmi naglo opada. Hronolon se dobro razgrađuje na hidrosilirane metabolite.

INDIKACIJE

U slučajevima patoloških hormonalnih poremećaja koji rezultuju izostankom ovulacije kod ovaca i koza.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjuje se kod gravidnih ovaca i koza.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nema.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Ovce i koze.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Samo za primjenu kod ženki (ovce i koze) koje nisu gravidne.

Intra-vaginalna aplikacija Chronogest CR spužvice vrši se pomoću aplikatora. Jedna doza predstavlja jednu spužvicu po životinji, bez obzira na tjelesnu masu, rasu, tip životinje i sezonu. Trajanje tretmana je 14 dana za ovce, te 11 dana za koze. Na kraju tretmana, Chronogest CR spužvica se uklanja nježnim povlačenjem vrpce sredstva za postepeno otpuštanje aktivne supstance. Da bi se poboljšala ovulacija preporučuje se PMSG injekcija za ovce, a za koze injekcija koja kombinuje prostaglandin F2 α i PMSG. Životinje ovuliraju između 36 i 72 sata nakon uklanjanja sredstva.

KARENCA

Ovce namijenjene za klanje: 2 dana; mlijeko: 0 dana.

Koze namijenjene za klanje: 5 dana; mlijeko: 3 muženja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati na temperaturi do 25°C .

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-1800/17 J.B; od 09. 05. 2018. godine.

OSTALI PODACI

Rok upotrebe: 3 godina.

Pakovanje: Kutija sa 1x25 vaginalnih sunđerica.

Način izdavanja: Na recept.

ATCvet kod: QG03D***

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet Productions, Rue De Lyons, Igoville, Francuska

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanjjska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina