

# SINTOFARM

# ADRIATICA

## d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

### CLOXALENE PLUS

#### **Intramamarna suspenzija**

#### SASTAV 5 ml (1 injektor)

Ampicilin natrujum	200 mg
Dicloxacin natrijum	200 mg
Nosač	do 5 ml

#### DJELOVANJE

Cloxalen plus je spoj polusintetskog pencilina Dicloxicilina (otpornog na enzim penicilazu) i ampicilina (osjetljivog na spomenuti enzim). Ovaj spoj dva antibiotika obezbjeđuje sinergiju djelovanja na inaktiviranje enzima penicilaze.

Dicloxacillin je vrlo djelotvoran na sve Gram + bakterije, a naročito na strafilokoke koji su proizvođači penicilaze.

Ampicilin djeluje na Gram – bakterije (*E.coli*, *Salmonella sp.*, *Pasterella sp. itd.*)

Ovaj lijek se preporučuje u liječenju akutnih mastitisa (tokom laktacije), subakutnih i hroničnih. Apsorbira se brzo nakon aplikacije u količini od 80% u veoma kratkom roku, a samim tim i brzo djeluje na oboljele dijelove parenhima mliječne žlijezde kod krava u laktaciji. Eliminacija lijeka je putem mlijeka, a mali dio koji se absorbuje u drugim dijelovima organizma eliminiše se putem urina.

#### INDIKACIJE

Koristi se za liječenje akutnih, subakutnih i subkliničkih mastitisa kod krava tokom laktacije.

#### NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE

Sadržaj injektora prije upotrebe dobro protresti. Prije upotrebe lijeka vime dobro oprati, izmusti, a vrh sise obavezno tretirati antiseptikom. Zatim se vrh injektora oprezno uvede u sisni kanal i kontinuiranim pritiskom sadržaja injektora aplicirati u mliječnu oboljelu

čtvrt. Nakon aplikacije lijeka obavezno izmasirati sisu od vrha prema bazi kako bi se obezbjedilo bolje prodiranje lijeka u gornje dijelove mliječne cisterne. U svaku četvrt oboljelog vimena aplicira se sadržaj jednog injektora u razmaku od 12 sati i tako ponoviti minimum dva (2), a najviše četiri (4) puta.

#### POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA PRIMJENU

Ukoliko je moguće, ovaj lijek treba koristiti na osnovu rezultata antibiograma. Neodgovarajuće korištenje proizvoda može dovesti do rezistencije bakterija na penicilin.

#### Posebne mjere predostrožnosti kod osoba koje daju proizvod životinjama

Osobe koje su preosjetljive na penicilin moraju izbjegavati kontakt sa proizvodom.

#### NEGATIVNE REAKCIJE (učestalost i ozbiljnost)

Životinjama koje su posebno osjetljive na penicilin lijek može izazvati alergijske reakcije. Ukoliko se uoče znaci alergije, liječenje prekinuti i primjeniti antialergijsku terapiju.

#### KORIŠTENJE TOKOM GRAVIDNOSTI, DOJENJA

Može se koristiti tokom trudnoće i dojenja.

#### INTERAKCIJE SA OSTALIM VETERINARSKIM LIJEKOVIMA I DRUGI OBLICI INTERAKCIJE

Polusintetički penicilini mogu biti spojeni sa aminoglikozidnim antibioticima. Ne koristiti zajedno baktericide i bakteriostatike.

#### KARENCA

Meso: 10 dana

Mlijeko: 48 sati

#### NAČIN IZDAVANJA

Veterinraski recept.

#### NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, hladnom i tamnom mjestu.

#### ROK UPOTREBE

2 godine

#### NAČIN PAKOVANJA

Kutija od 4 tube po 5 ml

Kutija od 12 tuba po 5 ml

#### BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-1292/15 J.B., od 22. februara 2016. godine

*PROIZVOĐAČ: **Fatro s.p.a**, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell Emilia (BO) Italy – Casella Postale/P.O. box 2*

