

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

CORMICINA

Injekcioni rastvor za goveda i svinje

SASTAV u 1 ml

- Benzil penicillin procaina 250.000 IJ
- Dihidrostreptomicin 250 mg
(što odgovara dihidrostreptomicin sulfata 312,98 mg)
- Betametazon dinatrijum fosfat 0,50 mg
- Nosač je hlorhidratni prokain i natrijum aldehid, povidon, natrijum citrat - voda za injekciju do 1 ml.

DJELOVANJE

Lijek djeluje na G+ i Gram – bakterije. Betametazon je jak kortikosteroid, i ima antiupalno, antitoksično i antialergijsko djelovanje.

INDIKACIJA

Cormicin se koristi u liječenju bakterijskih infekcija respiratornog aparata (brohitisa, pulmonitisa, bronhopulmonitisa i pleuritisa)

Infekcije urogenitalnog aparata (akutni mastitis, septički metritis)

Kod terapija polisierozitisa, poliartritisa, sepsa, kod edema i akutnog ekcema.

Lijek se ne koristi se kod gravidnih životinja i životinja koje doje.

KONTRAINDIKACIJA

Ne smije se koristiti kod životinja koje boluju od renalnih oboljenja, dijabetesa i kod životinja osjetljivih na penicilline i kortizone. Može izazvati, kod čestog korištenja

osteoporozu, ulkus rožnjače i želuca, hipertenziju, glaukom i bolesti srca. Ne koristi se kod gravidnih životinja i životinja koje doje.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Koristi se 10 ml/100 kg žive vase tokom 24 sata i/m. Terapija Cormicinom traje 1 dan, a u težim slučajevima, najduže 3 dana, pod strogom kontrolom veterinara.

Lijek se može se koristiti u teškim slučajevima oboljenja u razmaku i od 12 sati, također pod strogom kontrolom i na odgovornost veterinara.

Prije aplikacije lijeka životinju treba izvagati kako bi se dala odgovarajuća količina lijeka.

UPOZORENJE:

Prije upotrebe lijek treba dobro promućkati.

Lijek se ne koristi kod gravidnih i životinja osjetljivih na penicilline.

Ne smije se miješati sa ostalim antibioticima.

KARENCA

Meso i organi goveda i svinja: 74 dana

Lijek se ne upotrebljava kod krava čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati u suhoj i hladnoj prostoriji na temperaturi ispod 25 °C.

Koristi se 28 dana nakon otvaranja.

ROK UPOTREBE

18 mjeseci.

PAKOVANJE

Boce od 100 ml

Boce od 250 ml

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17- 983/17, od 30. oktobra 2017. godine

Vlasnik i proizvođač: **Fatro** s.p.a Italy www.fatro.it

Zastupnik i distributer: **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje** BiH.
www.sintofarm-adriatica.com