

SINTOFARM

ADRIATICA

d.o.o.

VIII ul. br. 57, 76270 Orašje
ID broj: 4254130240000
PDV broj: 254130240000
Tel./fax: +387 31/717-168
e-mail: info@sintofarm-adriatica.com

DALMARELIN

Injekcioni rastvor za krave i kuniće
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV u 1 ml

Lecirelin acetat (što odgovara lecirelinu)	25 µg
Nosač: benzilni alkohol (E1519)	20 mg

DJELOVANJE

Dalmarelin je injekcijski rastvor koji sadrži lecirelin, sintetički hormon koji je analog hormonu gonadotropina (GnRH), od kojeg se razlikuje u zamjeni glicina u poziciji 6 sa amino acid d-tert-leucinom, i zamjenom glicina u poziciji 10 sa etilamid grupom. Ove strukturne promjene povećavaju afinitet receptora hipofize rezultirajući povećanjem proizvodnje LH i FSH u plazmi na period od 240 minuta, za razliku od 90 minuta - trajanja prirodnog hormona.

Licerin je visoko potentan ali ne usporava GnRH receptore.

INDIKACIJE

Krave:

- Liječenje folikularnih cisti jajnika
- Indukcija ovulacije u momentu inseminacije, u slučaju kratkog tihog ili produženog tjeranja (patoloških stanja)

Kunići: Samo kod životinja koje ne služe u ishrani ljudi, i to:

- Indukcija ovulacije
- Povećanje broja legala tokom godine

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne smije koristiti kod gravidnih životinja.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Proizvod se aplicira intramuskularno:

Krave:

- Liječenje cisti ovarija: 4 ml.
- Indukcija ovulacije u momentu osjemenjivanja kao i pojačavanje tihih estrusa i njihovo produžavanje: 2 ml

Ženke kunića:

- Indukcija ovulacije: 0,2 ml
- Poboljšanje i povećanje broja oplodjenih jajnih stanica 0,3 ml

Lijek se može aplicirati kod ženki kunića, 24 sata odmah nakon poroda - okota.

Oplodnju ili pripust ženke kunića izvršiti odmah nakon aplikacije lijeka.

NUSPOJAVE

Nisu poznate. Lijek se može koristiti tokom perioda laktacije.

INTERAKCIJA SA OSTALIM LIJEKOVIMA

Ne koristiti ga istovremeno sa ostalim lijekovima.

KARENCA

- Meso i iznutrice: 0 dana
- Mlijeko: 0 dana

NAČIN IZDAVANJA:

Na veterinarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom, mračnom i hladnom prostoru, na temperaturi ispod 25° C.

Držati dalje od dohvata djece.

ROK UPOTREBE

2 godine. Nakon prvog otvaranja lijek se mora potrošiti u roku od 28 dana.

PAKOVANJE

4 ml bočica, 10 ml bočica, 20 ml bočica

POSEBNE MJERE OPREZA ZA OSOBE KOJE DAJU LIJEK

Žene u reproduktivnom periodu ili gravidne žene moraju ovaj lijek davati životinjama uz mjere opreza, jer se lijek pokazao toksičan za fetus pacova. U slučaju da lijek dođe u kontakt sa kožom (lijek se resorbuje i preko nepovrijeđene kože), za osobu koja daje lijek, savjetuje se da mjesto kontakta odmah ispere vodom i sapunom.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA: UP-I-06-2-24/17-1394/17 J.B, od 14. 11. 2017. godine

VLASNIK I PROIZVOĐAČ: **Fatro** s.p.a, Via Emilia 285 – 40064 Ozzano dell Emilia (BO) Italy
– Casella Postale/P.O. box 2

UVOZNIK I DISTRIBUTER: **SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje**, VIII ulica br. 57, 76270
Orašje, BiH

Tel/fax: +387/31-717-168 E-mail: info@sintofarm-adriatica.com

www.sintofarm-adriatica.com