



Defensor 3

SASTAV

Vakcina sadržava betapropiolaktonom inaktivirani virus bjesnoće, soj Pasteur Fix, uzgojen na BHK stanicama i adsorbiran na aluminij-hidroksid i konzerviran metriolatom i gentamicinom.

INDIKACIJE

Imunoprofilaksa bjesnoće u zdravih pasa, mačaka, goveda i ovaca.

KONTRAINDIKACIJE

Ne smiju se vakcinirati bolesne životinje. Također se ne smiju vakcinirati životinje sumnjive na infekciju ili već oboljele životinje.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Prije aplikacije vakcina se mora dobro promućkati. Doza za pse i mačke iznosi 1 ml, a za ovce i goveda 2 ml. Vakcina se psima daje s.k. i i.m., mačkama s.k., a ovcama i govedima i.m.

Vakciniraju se životinje u dobi od 3 mjeseca, u okviru sljedećeg programa:

Psi i mačke:

1. *Primovakcinacija* (osnovno cijepljenje): aplicira se 1 doza, a nakon godine dana druga doza vakcine.
2. *Revakcinacija* („booster“) kontinuirano održavanje imunosti: s obzirom trajanja imuniteta, životinje se mogu vakcinisati svake 3 godine, odnosno i prije ako to zahtjevaju aktuelni propisi.

Goveda i ovce:

1. *Primovakcinacija* (osnovno cijepljenje): aplicira se 1 doza (2 ml), a nakon godine dana druga doza vakcine.
2. *Revakcinacija* se ne preporučuje ukoliko u toku sljedeće godine nema pojавa oboljenja kod ovih vrsta životinja.

Ukoliko postoji i dalje pojava oboljenja kod ovih vrsta životinja na nekom epizootiološkom području, revakcinacija se može vršiti sa jednom dozom vakcine u skladu sa aktuelnim propisima.

NAPOMENA I MJERE OPREZA

U svakoj populaciji životinja postoji manji broj jedinki koje ne mogu optimalno odgovoriti na vakcinaciju te im je imuni odziv slabiji. Pri tome valja paziti da životinje nisu u inkubaciji bilo koje bolesti, nedovoljno hranjene, napadnute parazitima, stresirane transportom ili drugim

nepovoljnim utjecajima iz okoline.

Nije preporučljivo vakcinitati gravidne životinje.

Kao i u drugih vakcina, iako rijetko, može se nakon cijepljenja javiti anafilaksiska reakcija. U tom slučaju treba odmah primijeniti adrenalin.

Duze izlaganje vakcine višoj temperaturi od dozvoljene može umanjiti njenu imunogenost.

Boćice sa djelomično ili u cijelosti iskorištenom vakcinom valja neškodljivo ukloniti – prokuhati ili uroniti u odgovarajući dezinficijens.

KARENCA

S obzirom da je vakcini zbog mogućeg bakterijskog zagađenja dodan antibiotik gentamicin, meso i jestiva tkiva ovaca i goveda nisu prikladna za ishranu 21 dan nakon vakcinacije.

NAČIN ČUVANJA

Vakcina se čuva u hladnjaku pri temperaturi od 2 do 7 °C, izvan dosega djece. Vakcina se ne smije smrznuti.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

ROK VALJANOSTI

Označen je na opremi.

NAČIN PAKOVANJA

Kutija s 50 boćica po 1 ml vakcine.

Kutija s 5 boćica po 10 ml vakcine.

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-777/12 od 07.05.2012.

PROIZVOĐAČ

Zoetis Inc.

Kalamazoo, MI 49007

USA

ZASTUPNIK

Expertus Solutio doo Sarajevo

Dobrinjska do br.27

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina