

Uputstvo za upotrebu

1. NAZIV LIJEKA

DEHINEL PLUS tablete
febantel, pirantel embonat, prazikvantel
Psi

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta sadrži:

Aktivna supstanca:

Febantel	150 mg
Pirantel embonat	144 mg
Prazikvantel	50 mg

Pomoćne supstance:

kukuruzni škrob, laktoza monohidrat, povidon, natrijev laurilsulfat, mikrokristalična celuloza, koloidni bezvodni silikagel, magnezijev stearat

3. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

4. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 125A, 71 000 Sarajevo

5. INDIKACIJE

Dehinel PLUS tablete se koriste za prevenciju i liječenje mješovitih parazitskih infekcija kod pasa:

Askaridi: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*

Nematodi: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* i *Trichuris vulpis*.

Cestodi: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*,
Taenia spp., *Multiceps multiceps* i *Mesocestoides spp.*

6. KONTRAINDIKACIJE

Ne treba davati gravidnim kujama u prve dvije trećine graviditeta.

7. NUSPOJAVE

Do sada nisu poznate.

8. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

9. DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Preporučena doza Dehinel® Plus tableta je 1 tbl/10 kg tm. To znači da se pojedine aktivne supstance daju u sljedećim dozama: febantel 15 mg/kg, pirantel-embonat 14,4 mg/kg i prazikvantel 5 mg/kg.

Prilikom doziranja treba se ravnati prema sljedećoj tablici:

Veličina psa	Tjelesna Masa	Doza
Štenad i mali psi	do 5.0 kg	1/2 tablete
	do 10 kg	1 tableta
Srednje veliki psi	15 kg	1 1/2 tableta
	20 kg	2 tablete
	30 kg	3 tablete
Vrlo veliki psi	40 kg	4 tablete
	50 kg	5 tableta
	60 kg	6 tableta

Tableta se psima stavi na korijen jezika ili se sakrije u komadić mesa, kobasice odnosno sira. Dovoljna je jednokratna aplikacija.

10. KARENCA

Nije propisana.

11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

12. POSEBNA UPOZORENJA

Dehinel Plus ne daje se isto vrijeme s holinergičnim anthelminticima (levamizol) ni supstancama koje koče aktivnost AChE (organofosforni spojevi). Također se ne daje paralelno s piperazinom koji izaziva neuromuskularnu paralizu askarida jer bi se mogao poremetiti učinak pirantela koji obliće spastično paralizira.

Štenad se najranije dehelmintizira kada navršši tri sedmice. Pri invaziji štenadi s askardijama, tretman se treba ponoviti u 6. i 12. sedmici starosti.

Za primjenu na životinjama

Nema

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

Može se davati gravidnim kujama tokom posljednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.

13. POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Neiskorišten lijek ili ostatak lijeka se uništavaju u skladu sa važećim propisima (Sl. novine 33/03-Zakon o upravljanju otpadom)

14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Juli, 2014. godine

15. OSTALI PODACI

Broj dozvole za stavljanje u promet: UP-I-06-2-24/17-958/14 od 23.07.2014.

Način izdavanja: bez recepta.

Rok upotrebe: 4 godine.

Pakovanje: 1 x 2 tablete; 1 x 4 tablete; 1 x 6 tableta; 1 x 10 tableta; 1 x 20 tableta; 1 x 100 tableta.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

ATCvet kod: QP52AC55