

**UPUTA O LIJEKU**  
**DIAZINOL 60% m/v**  
**koncentrat za emulziju za goveda,ovce,koze i svinje**  
**Za upotrebu u veterinarstvu**

**NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA**

DIAZINOL 60% m/v koncentrat za emulziju za goveda,ovce,koze i svinje.

**AKTIVNA/E SUPSTANCA/E I OSTALI SASTOJCI**

100 ml koncentrat za emulziju sadrži:

Diazinon ..... .... 60 g

**INDIKACIJA/E**

Proizvod Diazinol je antiparazitski koncentrat za emulziju za eksternu upotrebu.Preporučuje se za prevenciju i liječenje šuge ( sarkoptičke, psoroptske, horioptičke, demodektočke ) i ektoparazitoze koju uzrokuju krpelji, vaši, buhe i ostali insekti kod goveda,ovaca,koza i svinja.

**KONTRAINDIKACIJE**

Ne primjenjivati kod peradi i mačaka. Ne liječiti životinje tokom vlažnog i vrućeg perioda.  
Ne primjenjivati liječenje DIAZINOLOM kod mlađih goveda starosti do 6 sedmica i mlade prasadi.Ne kupati ovce prvih 14 dana nakon šišanja,slabe životinje,životinje u graviditetu, žedne životinje ili životinje sa ranama po koži ,nastale šišanjem ili nekom drugom traumom.

**NEŽELJENE REAKCIJE**

Tokom liječenja sa Diazinolom povremeno se može pojaviti iritacija kože,svrab,koža može postati suha ili se na koži mogu pojaviti pukotine.

**U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/08).**

**CILJANE VRSTE**

Goveda, ovce, koze, svinje

**DOZA ZA SVAKU VRSTU,NAČIN I METODA PRIMJENE**

Proizvod se primjenjuje samo eksterno u obliku lokalnog liječenja prskanjem ili u obliku kupki. Trajanje i frekvencija primjene tretmana zavisi od prirode parazita, vremenskih uslova i stepena zaraze. Antiparazitno liječenje se ponavlja u intervalima od 10 do 14 dana u zavisnosti od vrste parazita i stepena zaraze. Rastvori se pripremaju i koriste isti dan.

### **Goveda:**

**Prskanje:** 20 ml Diazinola/20 l vode; rastvor 1:1000 (600 ppm a.s.)

Prskanje se vrši na svim dijelovima tijela životinje.

**Lokalno liječenje:** 5 ml Diazinola/1 l vode, rastvor 1:200 (3000 ppm a.s.)

### **Ovce i koze:**

**Kupke:** početni rastvor za punjenje spremnika 420 ml Diazinola/ 1000 l vode,rastvor od 1:2400 (250 ppm a.s.)

**Ponovno punjenje** (dopunsko) kupke 250 ml DIAZINOLA /200 l vode rastvor od 1:800 (750ppm a.s.)

**Lokalno liječenje:** 5 ml Diazinola/1 l vode rastvor 1:200 (3000 ppm a.s. )

**Prskanje:** 20 ml Diazinola/20 l vode rastvor 1:1000(600 ppm.a.s.)

Za kupanje je potrebno da visina rastvora u kupci bude 70 cm za janjad i mlađe životinje i 100 cm za odrasle ovce. Ključno je održavati koncentraciju kupke dopinjavanjem kad se zapremina smanji za 10%. Životinje se moraju kompletno uroniti u kupku najmanje jednom.

### **Svinje:**

**Prskanje:** protiv šuge 10 ml Diazinola/24 l vode rastvor od 1:2400(250 ppm a.s.)

## **UPUSTVO ZA PRAVILNU PRIMJENU LIJEKA**

Treba slijediti koncentraciju za primjenu.

### **KARENCA**

**Meso i organi:** Goveda,ovce,koze,svinje 14 dana

**Mlijeko:** Goveda,ovce,koze 3 dana. Nakon kupanja DIAZINOLOM obavezno oprati vime životinja koje daju mlijeko.

Ne primjenjivati liječenje DIAZINOLOM kod mlađih goveda starosti do 6 sedmica i mlađe prasadi.Ne kupati ovce prvih 14 danan nakon šišanja,slabe životinje,životinje u graviditetu, žedne životinje ili životinje sa ranama po koži , nastale šišanjem ili nekom drugom traumom.

### **POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM SKLADIŠTENJA**

Držati izvan dohvata djece. Čuvati na suhom mjestu, u čvrsto zatvorenom orginalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Podalje od direktnog izvora svjetlosti, podalje od izvora toplote i mraza. Ne koristiti nakon isteka roka koji se navodi na etiketi. Rok trajanja nakon prvog otvaranja primarnog pakovanja:12 mjeseci. Nakon rastvaranja iskoristiti proizvod u roku od 24 h.

### **POSEBNO/A UPOZORENJE/A**

Rastvor za kupanje se koristi samo na dan pripreme, nakon toga se prostor za kupanje isprazni i dobro opere. Ne dodavati bakar sulfat ili neki drugi agens za ovlaživanje u rastvor za kupku. Nakon kupanja operite vime životinja koje daju mlijeko. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom. Operite ruke i dijelove tijela koji su stupili u kontakt s proizvodom. Aktivna supstanca,diazinon je visokotoksična za vodene organizme i pčele.

Ne primjenjivati liječenje DIAZINOLOM kod mlađih goveda starosti do 6 sedmica i mlađe prasadi.Ne kupati ovce prvih 14 danan nakon šišanja,slabe životinje,životinje u graviditetu, žedne životinje ili životinje sa ranama po koži , nastale šišanjem ili nekom drugom traumom

## **POSEBNE MJERE OPREZA ZA ODLAGANJE NEISKORIŠTENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA AKO POSTOJE**

Bilo koji neupotrijebjeni lijek ili otpadni materijali dobiveni primjenog tog lijeka treba se odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ 33/03).

Lijek namjenjen kupanju životinja, priprema se neposredno pred postupak u čistom bazenu. Zabranjeno je otopinu lijeka ili ostatke primjene lijeka ispuštati u vodotokove ili prospipati po okolišu, jer su toksični za vodene organizme i pčele.

### **ROK VALJANOSTI**

Ne koristiti poslije isteka roka valjanosti naznačenog na pakiranju.

### **BROJ I DATUM RJEŠENJA**

UP- I- 06-2-24/17-1909/19 J.B; od 27. januara 2020. godine

### **NAČIN IZDAVANJA**

Izdaje se na veterinarski recept

### **FARMAKOLOŠKE KARAKTERISTIKE**

Aktivne supstance diazinon je insekticid koji se sastoji iz organske fosforne sinteze, koja djeluje kroz kontakt i probavljanje eksternih parazita blokiranje acetil holin esteraze.

Diazinon se stabilno veže za enzim, te ga ireverzibilno blokira, a acetilholinski hemijski posrednik koji ostaje nehidroliziran i koji se akumulira, paraliza neuromišićni sistem parazita. Zbog svoje rastvorivosti Diazinon se dobro apsorbuje kroz kožu i prolazi kroz metabolizam, a većinom se izbacuje kroz urin. Većina glavne supstance se nalazi u salu i mišićima, a u manjim ostacima u bubrežima i jetri.

**PROTULIJEK: ATROPIN ili TOKSOGONIN ,koji se primjenjuje pod medicinskim nadzorom.**

**PAKOVANJE:** Izgled proizvoda

Staklene boćice tip II od 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml i boćice od polietilena niske gustoće od 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml i 5000 ml.

Sekundarno pakovanje:

Kartonska kutija 10 boćica x 1 ml

Kartonska kutija 10 boćica x 2 ml

Kartonska kutija 10 boćica x 5 ml

Kartonska kutija 10 boćica x 10 ml

### **NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

S.C PASTEUR – FILIALA FILIPEŞTI S.R.L.

Ulica Principală 944, Filipeştii de

Pădure, Okrug Prahova, Rumunja.  
Tel.: +40 244.386.888; +40 244.386.699  
Fax: +40 244.386.032  
e-mail:pasteur.filipesti@pasteur.ro

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Poljovet d.o.o.  
Ormanica bb  
76250 Gradačac  
Bosna i Hercegovina  
Tel: +387 35 824 425; +387 35 824 426  
Fax: +387 49 745 630; +387 35 745 646  
email: poljovet@poljovet.com