



Depo - Promone®

injekcijska suspenzija

hormonalni lijek za prevenciju estrus, liječenje metroragije za kuje i mačke

SASTAV:

1 mL injekcijske suspenzije sadrži:

Medroksiprogesteron acetata 50 mg

DJELOVANJE

Aktivna supstanca u preparatu medroksiprogesteron acetat je sintetsko progesteronsko jedinjenje steriodne građe koje kao i ostali progestageni oponaša efekte prirodnog progesterona. Depo – Promone® djeluje tako što priprema i održava ženski reproduktivni trakt za implantaciju oplođene jajne ćelije i graviditet.

Progestageni inhibiraju estrus i ovulaciju, deprimirajući produkciju hormona iz prednjeg režnja hipofize, te posljedično tome, razvoj folikula. Depo – Promone® u mužjaka djeluje tako što umanjuje produkciju testosterona.

INDIKACIJE

Kuje:

- preveniranje pojave estrusa
- preveniranje pseudograviditeta
- metroragija

Mačke :

- preveniranje estrusa
- metroragija
- nimfomanija

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne smije davati gravidnim životnjama, životnjama koje su imale vaginalno pražnjenje ili imaju određene reproduktivne abnormalnosti, spolno nezrelim životnjama, psima i mačkama namjenjenim za parenje kao i životnjama oboljelim od diabetesa.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Lijek se aplica subkutano.

Kuje :

Preveniranje estrusa i pseudograviditeta :

1 mL (50 mg medroksiprogesterona), odnosno 1,5 – 2 mL (75 – 100 mg medroksiprogesterona) za kuje teže od 45 kg. Lijek se daje svakih 6 mjeseci u drugoj polovini anestrusa.

Metroragija :

1 mL (50 mg medroksiprogesterona).

Mačke :

Preveniranje estrusa :

1 mL (50 mg medroksiprogesterona) po životinji. Lijek se mačkama daje svakih 4 mjeseca u drugoj polovini anestrusa.

Metroragija i nimfomanija :
1 mL (50 mg medroksiprogesterona).

NUSPOJAVE

Ponekad kod tretiranih životinja može doći do cistične endometrijalne hiperplazije, mukometre i piometre.

NAPOMENE

Tretman se mora izvršiti u drugoj polovini anestrusa (oko 3 mjeseca nakon estrusa). Ukoliko se Depo – Promone® primjenjuje samo kada je to indicirano i u skladu sa uputstvom, rizik od nastajanja piometre ili cistične degeneracije endometrija je vrlo mali. Ukoliko Depo – Promone® nije primjenjen na adekvatan način normalan ciklus gonjenja će se uspostaviti. Vremenski razmak između zadnje alikacije i slijedećeg ciklusa je različit i varira od životinje do životinje, odnosno od 6 – 24 mjeseci, na što se mora upozoriti vlasnik. Nakon subkutane aplikacije na mjestu aplikacije lijeka može doći do opadanja, pa zato aplikaciju treba izvršiti na manje vidnom mjestu. Prilikom primjene lijeka koji sadrži progestagene treba pažljivo rukovati i paziti da žene i djeca ne dođu u kontakt sa ovim lijekom. Obavezno, prilikom primjene preparata koristiti rukavice i poslije toga oprati ruke.

KARENCA

Nije propisana budući se lijek ne primjenjuje u životinja koje se koriste u prehrani ljudi.

NAČIN ČUVANJA

Na tamnome i hladnom mjestu i izvan dohvata djece.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

ROK VALJANOSTI

Označen je na opremi (u izvornoj ambalaži 3 godine).

PAKOVANJE

Bočica sa 5 mL lijeka.

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-24/17-740/14 od 17.06.2014.

PROIZVOĐAČ

Zoetis Belgium SA,
Mercuriusstraat 20, B-1930 Zaventem,
Belgija

ZASTUPNIK

Expertus Solutio doo Sarajevo
Dobrinjska do br.27
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina