

DIFTOSEC,

Zamrznuto osušeno živo cjepivo protiv boginja peradi u kokoši i pura.

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DIFTOSEC

Zamrznuto osušeno živo cjepivo protiv boginja peradi u kokoši i pura.

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Svaka doza od rekonstituiranog cjepiva sadrži:

- Kokošji pox virus, DCEP 25 modificirani soj, najmanje10⁹ CCID₅₀

- Saharozu, najviše 0,16 mg.

- Protein hidrolizat, najviše 0,08 mg.

- Glicerol otapala, q.s 0,01 ml.

* Kultura stanica infekcija doza 50.

4. INDIKACIJE

Cijepljenje protiv kokošnjih boginja kod:

- Kokoši: tovnih pilića, budući roditelji.

- Pure: brojerski purani – mlade pure i budući roditelji.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne cijepiti ptice u dobi od manje od 4 tjedna.

6. NUSPOJAVE

Nema

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoši: tovni pilići, budući roditelji. Pure: brojerski purani, mlade pure i budući roditelji.

8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

NAČIN PRIMJENE

- Korištenje odmah nakon rekonstitucije s otapalom,

- s/c.

- Nakon rekonstitucije cjepiva u glicerol otapalu, tresti pažljivo i primijeniti cjepivo injekcijom u krilnu membranu ili na vanjsku stranu bedra.

Doziranje: jedna doza 0,01 ml, bez obzira na težinu ptice, po sljedećem rasporedu:

* Zdrav okoliš:

- Cijepljenje od dobi od 4 tjedna

- Godišnji booster za ptice koje se drže dulje od 18 mjeseci.

* Kontaminiranog okoliša:

- Cijepljenje od dobi od 4 tjedna

- Nakon toga booster 3 mjeseca kasnije, a zatim svake godine.

9. SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Cijepljenje samo zdravih životinja. Primijeniti uobičajene aseptičke postupke.

11. POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Pripravak se čuva i prevozi na temperature od 2-8°C zaštićen od svjetla.

12. KARENCIJA:

Meso i organi peradi: 3 sedmice. Ne cijepiti ptice u dobi manje od 4 tjedna.

13. POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Nema

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama.

Smiju se cijepiti samo zdrave kokoši.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama.

U slučaju samoinjiciranja osobe koja primjenjuje vakcinu, odmah potražite savjet liječnika.

Ostale mjere opreza

Nema.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Nema podataka o sigurnosti i učinkovitosti ovog cjepiva kada se koristi s bilo kojom drugim veterinarsko-medicinskom proizvodom.

Odluka o korištenju ovog cjepiva prije ili poslije bilo kojeg drugog VMP-a stoga mora biti napravljen od slučaja do slučaja.

Inkompatibilnosti:

Cjepivo se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti)

Nema

14. POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s Zakonom o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

15. OSTALE INFORMACIJE

Samo za primjenu na životinjama.

16. NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se samo na veterinarski recept.

Rok valjanosti: 2 godine

Jednom rekonstituiranu vakcinu odmah utrošiti.

17. PAKOVANJE:

Staklena bočica za 1000 doza

Kutija sa 10 bočica od 1000 doza.

ATCvet code: QI01AD12

18. BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-396/18, od 14. 05. 2018. Godine

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet:

ARNIKA VETERINA SA d.o.o.

Ismeta Alajbegovića Šerbe 7

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

19. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet

Meril SAS, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, France