

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

DOXIPAN 54 500 MG/G

prašak za upotrebu u vodi za piće za brojlerske piliće, ćurke i svinje

Za upotrebu u veterinarstvu

Sastav: 1 g proizvoda sadrži:

Aktivnu supstancu

Doksicilin hikat (ekvivalent doksiciklin hidrohloridu) 500mg

Pomoćne supstance 1g

Farmaceutski oblik: rastvorljivi prašak za upotrebu u vodi za piće

Ciljane vrste: brojlerski pilići, ćurke i svinje.

Indikacije:

Brojlerski pilići: Liječenje hroničnih respiratornih bolesti uzrokovanih bakterijama osjetljivim na doksiciklin kao što su *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*.

Ćurke: Liječenje respiratornih i zglobnih sindroma uzrokovanih *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*.

Svinje: Liječenje infekcija uzrokovanih Gram pozitivnim i Gram negativnim bakterijama osjetljivim na doksiciklin, a naročito infekcija respiratornog sistema, uzrokovanih bakterijama (*Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica* i *Pasteurella multocida*) i/ ili mikoplazmatskih infekcija (*Mycoplasma hyopneumoniae*), MMA sindrom (mastitis-metritis-agalaktia) kod krmača.

Kontraindikacije :

Ne koristiti kod životinja sa poznatom hipersenzitivnošću na doksiciklin ili neki drugi dodatak.

Korištenje nije dozvoljeno kod životinja čija se jaja koriste za ljudsku upotrebu.

Neželjene reakcije:

Nisu poznate.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70 /08).

Doziranje, način primjene i metoda administracije:

Brojlerski pilići: 10mg doksiciklina /kg tjelesne mase tokom 5 dana

Ćurke: 20mg doksiciklina /kg tjelesne mase tokom 5 dana.

Svinje: 10mg doksiciklina /kg tjelesne mase tokom 5 dana.

Lijek se mora davati oralno rastvoren u vodi za piće ili tečnoj hrani prema propisanim uputama veterinaru, vodeći računa da se ne prekorači dnevna doza u mg aktivne supstance na kg tjelesne mase prema slijedećoj formuli:

$$\frac{\text{mg aktivne supstance}}{\text{/kg tj.masa}} \times \text{tj. masa životinja koja se namjeravaju liječiti (kg)} \times \text{broj životinja koje se liječi} = \text{mg aktivne supstance na litar vode ili tečne hrane}$$

Ukupna potrošnja vode/tečne hrane zabilježene u grupi za prethodni dan (l)

U obzir se treba uzeti slijedeća konverzija: 1 gr proizvoda= 500mg doksiciklina

Obratiti pažnju na dezinfekciju pojilica ili objekta, ili prisustvo hlora u vodi za piće, koji se mora primijentiti na ispravan način, po uputstvu proizvođača. U suprotnom, mogu imati negativan učinak na djelovanje tetraciklina.

Karenca:

Brojlerski pilići: meso i iznutrice: 3 dana

Ćurke: meso i iznutrice: 10 dana

Korištenje nije dozvoljeno kod kokoši nesilica i ćurki čija se jaja koriste za ljudsku upotrebu.

Svinje: meso i iznutrice: 4 dana

Specijalna upozorenja:

Specijalna upozorenja za svaku ciljanu vrstu:

Ne koristiti kod kokoši nesilica i ćurki čija se jaja koriste za ljudsku upotrebu.

Specijalna upozorenja za korištenje kod životinja:

Korištenje veterinarskog proizvoda bi trebalo ograničiti na farme na kojima je infekcija već utvrđena.

Zbog mogućih vremenskih i geografskih varijacija u osjetljivosti ciljanih mikrobnih vrsta na doksicikline, preporučuje se izvođenje bakteriološkog testa i testa osjetljivosti.

Pogrešna upotreba proizvoda može dovesti do prevalencije bakterija otpornih na doksicikline i smanjiti efikasnost liječenja sa drugim tetraciklinima zbog moguće pojave unakrsne rezistencije.

Unos medicinskih proizvoda kod životinja može biti izmjenjen usljed bolesti. Kod subjekata sa smanjenim unosom vode za piće liječenje mora biti izveden parenteralnom aplikacijom pogodnog proizvoda koji se ubrizgava na način propisan od veterinara.

Ponovljeno ili produženo davanje treba izbjegavati, poboljšanjem praksi upravljanja te čišćenjem i dezinfekcijom.

Specijalna upozorenja koja trebaju preuzeti osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama:

Rukovati sa proizvodom koristeći zaštitne rukavice i masku. Ne udisati, izbjegavati kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontaminacije isprati dobro sa vodom i sapunom.

Korištenje tokom gravidnosti, laktacije i nesenja:

Upotreba kod gravidnih ili mladih životinja može uzrokovati diskoloracije i hipoplaziju zuba i retardaciju rasta uzdužne kosti kod fetusa, jer se tetraciklini fiksiraju na koštanu strukturu u toku rasta. Tokom gravidnosti i laktacije preporučuje se korištenje nakon procjene koristi/rizika od strane veterinara.

Lijek se ne koristi kod kokoši nesilica i ćurki čija se jaja koriste za ljudsku ishranu.

Interakcija sa drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcije:

Pošto su tetraciklini bakteriostatski antibiotici, interakcija sa baktericidnim antibioticima kao što su penicilini (amoksisilin i fluorokvinoloni), mogu uzrokovati smanjenje terapijskog djelovanja, te se istovremena primjena ne preporučuje. Doksiciklin potpomaže djelovanje antikoagulanata. Rastvorljivost veterinarsko medicinskog proizvoda zavisi od pH i smanjuje se u alkalnoj sredini uz rizik formiranja taloga. Absorpcija doksiciklina se može smanjiti u prisustvu velikih količina kalcijuma, željeza, cinka, magnezijuma i aluminijuma prisutnih u hrani. Ne davati zajedno sa antacidima, kaolinom i preparatima sa željezom. Preporučuje se poštovanje intervala od 1-2 sata prije davanja drugog proizvoda koji sadrži polivalentne katione i antacide, kaolin i preparate na bazi željeza jer oni mogu ograničiti absorpciju tetraciklina.

Predoziranje:

Simptomi predoziranja su nepoznati. Ne smiju se davati više doze od preporučenih.

Inkompatibilnost:

Ne mješati lijek sa drugim veterinarsko medicinskim proizvodima. Doksicilin može proizvesti bivalentna kompleksna jedinjenja, posebno željeza ili kalcija, cinka i magnezijuma. Pošto su tetraciklini bakteriostatski antibiotici, interakcija sa baktericidnim antibioticima kao što su penicilini (amoksisilin i fluorokvinoloni), mogu uzrokovati smanjenje terapijskog djelovanja, te se istovremena primjena ne preporučuje.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 15 dana

Rok upotrebe nakon rastvaranja i rekonstitucije prema uputama: 6 sati

Specijalna upozorenja za čuvanje:

Držati kontejner dobro zatvoren da bude zaštićen od sunčevih zraka i vlage.

Držati van domašaja djece.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal :

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom, odnosno, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br.33/03).

Način izdavanja: na veterinarski recept.

Pakovanje: kutija 250g; vreća 1000g, 5000g

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-24/17-1213/18 J.B; od 16 oktobra 2018. godine

Proizvođač: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. , Viale Corassori 62, Modena, Italija
a LIVISTO company

Uvoznik za BiH: Bosna Vet doo Zenica, Gorazdanska 36a 72000 Zenica; tel: 032/423-196; fax: 032/423-194; e-mail: bosnavet@bih.net.ba

