



Duphalyte® 500 ml

Injekcijska solucija

Vitamini B kompleks, elektroliti, amino kiseline, dekstroza

SASTAV

1 ml injekcijske solucije sadržava:

Vitamini:

- Vitamin B1 (hydrochloride)	0.10mg
- Vitamin B2 (kao sodium phosphate)	0.04mg
- Vitamin B6 (hydrochloride)	0.10mg
- Vitamin B12	0.05mg
- Nicotinamide	1.50mg
- d-Panthenol	0.05mg

Elektroliti:

- Calcium chloride hexahydrate	0.23mg
- Magnesium sulphate · 7 H ₂ O	0.29mg
- Potassium chloride	0.20mg

Aminokiseline i hranjivi agensi:

- Anhydrous dextrose	45.46mg
- L-Arginine hydrochloride	0.025mg
- L-Cysteine hydrochloride monohydrate	0.01mg
- Monosodium glutamate	0.04mg
- L-Hystidine hydrochloride monohydrate	0.01mg
- L-Isoleucine	0.01mg
- L-Leucine	0.04mg
- L-Lysine hydrochloride	0.03mg
- L-Methionine	0.01mg
- dl-Phenylalanine	0.03mg
- L-Threonine	0.02mg
- dl-Tryptophan	0.01mg
- dl-Valine	0.05mg

Nosač:

- Methyl parahydroxybenzoate	1.80mg
- Propyl parahydroxybenzoate	0.20mg
- Phenol	0.10mg
- Disodium edetate	0.15mg
- Sodium acetate · 3 H ₂ O	2.50mg
- Citric acid monohydrate	
- Voda za injekciju q.s.	ad
	1.0ml

DJELOVANJE

Duphalyte se koristi kao potporna terapija kod oslabljenih ili dehidriranih životinja i kao potpora liječenju kod jakog proljeva i povraćanja. Posebno je koristan u kritičnim slučajevima kada je oralna aplikacija lijeka neadekvatna.

Dehidracija označava gubitak vode, glukoze i elektrolita, te u kritičnim situacijama amino kiselina i vitamina.

U Duphalyte amino kiseline su odmah dostupne kao građevni blokovi za sintezu proteina u krvi neophodnih za formiranje eritrocita i transport hormona i antitijela. Duphalyte sadrži dekstrozu za opskrbu energijom, elektrolite za zamjenu izgubljene tjelesne soli i vitamina B za nadoknadu stvaranja enzima.

INDIKACIJE

Koristi se kao podrška održavanju terapije u stanjima gubitka tečnosti, neizbalansiranosti elektrolita i hipoproteinemiji kod životinja. Može se koristiti kod goveda, konja, svinja, pasa, mačaka i živine.

KONTAINDIKACIJE

Lijek se ne smije aplicirati životinjama za koje je prethodno ustanovljeno da su preosjetljive na bilo koji sastojak lijeka.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

- Konji: isključivo spora intravenozna aplikacija.
- Goveda i svinje: spora intravenozna, intraperitonealna ili subkutana aplikacija.
- Psi i mačke: spora intravenozna ili subkutana aplikacija.
- Jednodnevni pilići: subkutana aplikacija.

Doziranje:

Konji, goveda i svinje:	najviše 100 ml/50 kg TM
Ždrjebad, telad i prasad:	najviše 30 ml/5 kg TM
Psi i mačke:	najviše 50 ml/5 kg TM
Jednodnevni pilići:	0,5 – 1 ml po piletu.

Duphalyte je dobro podnošljiv u visokim dozama koje su preporučene. Ovisno o stepenu dehidracije praktičar određuje dozu koju će aplicirati, a gore navedene doze ne bi trebalo prelaziti.

NAPOMENA

Preporučuje se spora aplikacija kod intravenozne aplikacija. Mjere asepske trebaju biti poštovane. Osobe sa osjetljivošću na sastojke ovog lijeka trebale bi izbjegavati kontakt sa proizvodom. U slučaju samoubrizgavanja, odmah potražiti savjet ljekara i pokazati mu uputstvo sa sastavom proizvoda. Držati proizvod van dosega dijece.

KARENCA

0 dana.

NAČIN ČUVANJA

Ukoliko se drži u neotpacovanoj boci na hladnom i tamnom mjestu (+2°C -+ 20°C)

ROK UPOTREBE

Označen je na pakovanju (36 mjeseci).

Jednom otvorena boca mora biti utrošena u roku od 28 dana.

NAČIN IZDAVANJA

Na veterinarski recept.

PAKOVANJE

Boca od 500 ml.

BROJ RJEŠENJA:

FBiH: UP-I-06-2-24/17-707-1/13 od 13.05.2013.

PROIZVOĐAČ

Fort Dodge Animal Health, (držaoc registracije Zoetis Belgium SA)

ZASTUPNIK:

Expertus Solutio doo Sarajevo
Dobrinjska do br.27
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina