

Duphapen Strep Injekcijska suspenzija

SASTAV

1 ml injekcijske suspenzije sadrži:

Prokain penicilina 200 mg

Dihidrostreptomicina u obliku dihidrostreptomicin sulfata 250 mg

DJELOVANJE

Duphapen Strep, kombinacija penicilina i dihidrostreptomicina djeluje protiv gram pozitivnih i gram negativnih bakterija što obezbjeđuje širok antibakterijski spektar. Duphapen Strep istovremeno obezbjeđuje bakteriostatski i baktericidni učinak protiv najčešćih uzročnika infekcija kod domaćih životinja: *Corynebacterium pyogenes*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria spp*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Salmonella spp*.

INDIKACIJE

Duphapen Strep se koristi kod goveda, konja, ovaca, svinja, pasa i mačaka za liječenje općih i lokalnih infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na kombinaciju penicilin-dihidrostreptomicin.

Neke od najčešćih indikacija za upotrebu Duphapen Strep injekcijske suspenzije su: respiratorne infekcije, infekcije mokraćnih puteva, gnojne infekcije, flegmone, panaricij, upale zglobova, upale pupka, puerperijske infekcije, mastitisi (uz istovremenu lokalnu terapiju), sekundarne infekcije koje prate enzootsku pneumoniju goveda, sekundarne infekcije virusnih bolesti pasa i mačaka kao i druge sekundarne infekcije.

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne smije aplicirati: intravenski, intratranelano, životinjama za koje je prethodno ustanovljeno da su preosjetljive na sastojke Duphapena Strep, zamorčadima, hrčima, kunićima, činčilama i drugim malim monogastričnim biljojedima.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Prije upotrebe bočicu s lijekom treba dobro promućkati. Lijek se daje duboko intramuskularno u dozama 2 ml/50 kg tjelesne mase za velike životinje i 1 ml/10 kg tjelesne mase za male životinje.

Preporučene doze po vrstama životinja:

Konji	500 kg	20 ml
Goveda	400 kg	16 ml
Ovce	50 kg	2 ml
Svinje	50 kg	2 ml
Psi	10 kg	1 ml
Mačke	5 kg	0,5 ml

Lijek je potrebno palicirati na najmanje dva mjesta ako doza prelazi više od: za konje 15 ml, za goveda 6 ml, za ovce 3 ml i za svinje 1,5 ml.

Lijek se aplicira jednom dnevno, a najčešće je potrebno terapiju provoditi 2 - 3 dana uzastopno.

NAPOMENA

Iz bočice lijek treba navući sterilnom i sasvim suhom iglom i špricom. Lijek nije djelotvoran protiv bakterija koje proizvode β laktamaze.

U slučaju alergijskih reakcija (promjene na koži, urtikarija, anafilaksija, otežano disanje, slinjenje i dr.) potrebno je poduzeti odgovarajuću terapiju (adrenalin, glukokortikoidi, antihistaminici).

Upotrebljavati sa posebnom oprezom kod životinja sa renalnim oboljenjima ili renalnom disfunkcijom.

Istovremena aplikacija tetraciklina i makrolida umanjuje učinak penicilina.

KARENCA

Goveda:

Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 23 dana.

Ne upotrebljavati kod životinja od kojih se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

Ovce:

Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 31 dan.

Ne upotrebljavati kod životinja od kojih se mlijeko koristi u ishrani ljudi.

Svinje:

Meso, organi i ostala jestiva tkiva: 18 dana.

Konji:

Lijek se ne koristi kod konja koji će biti korišteni u ishrani ljudi.

NAČIN ČUVANJA

Pri sobnoj temperaturi (do 25 C) i zaštićeno od svjetla

ROK UPOTREBE

Označen na pakovanju. U izvornoj ambalaži 24 mjeseca zaštićen od svjetla.

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se na veterinarski recept.

PAKOVANJE

Bočica sa 100 ml suspenzije.

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-24/17-924/15 od 10.11.2015.

PROIZVOĐAČ

„Zoetis“ Belgija

ZASTUPNIK:

Expertus Solutio doo Sarajevo

Dobrinjska do br.27

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina