

## **FATROXIMIN ENDOMAMMARIA ASCIUTTA**

**Intramamarna krema za krave i bufale u zasušenju**  
**Za upotrebu u veterinarstvu**

### **1. SASTAV: AKTIVNE TVARI I OSTALIH SASTOJAKA**

Jedna intramamarna šprica od 5 ml sadrži:

**Aktivne tvari:** rifaximina 100 mg;

**Pomoćne tvari:** to 5ml

### **2. INDIKACIJE**

FATROMIXIN Endommamario Asciutta je indiciran za period zasušenja za:

- terapiju subkliničkih, hroničnih mastitisa,
- prevencija novih infekcija tokom perioda zasušenja,
- prevencija akutnog mastitisa koji se može javiti nakon poroda izazvane uzročnicima osjetljivim na rifaximin, a posebno *Staphilococcus aureus* (uključujući i one koji su rezistentni na peniciline), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Actinomyces pyogenes*.

### **3. KONTRAINDIKACIJE**

Ne davati životinjama kod kojih se zapaža preosjetljivost na riflaximina ili na bilo koju dodatnu tvar.

Lijek se ne smije давати у периоду од 7 седмица прије очекиваног телена.

### **4. NEŽELJENA DEJSTVA**

Nisu zapažena.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

### **5. ŽIVOTINJSKE VRSTE KOJIMA JE NAMJENJENO**

Mliječne krave i bufale (bivoli)

### **6. DOZIRANJE ZA SVAKU OD VRSTA, NAČINI I MODALITETI DAVANJA LIJEKA**

Jedna šprica FATROMIXIN Endommamario Asciutta odgovara 100 mg riflaximina za četvrt vimena, nakon posljednje muže, u periodu od 7 sedmica prije predviđenog oteljaja.

Pomusti i okapati do kraja svaku četvrta vimena, dakle očistiti i dezinficirati vimene bradavice/sise (posebno otvor) sa odgovarajućim preparatom.

Skinuti zaštitu sa kanile intramamarne šprice za djelimično uvlačenje, dok za kompletno davanje ljeka je neophodno uklanjanje i cilindra za ograničavanje.

Uvući kanilu u kanal bradavice i injektirati u unutrašnjost kompletan sadržaj šprice intramamarne.

Izvući kanilu, uhvatiti sa prstima jedne ruke kraj bradavice/sise i sa palcem i kažiprstom druge ruke potisnuti nježno prema gore proizvod koji se nalazi u kanalu ove bradavice/sise.

Masirati dakle nježno sa obje ruke četvrt vimena potiskujući prema gore da bi se proizvod ujednačeno proširio u cijelom žlezdanom dijelu vimena.

### **7. UPOZORENJE ZA ISPRAVNO DAVANJE LJEKA**

FATROMIXIN Endommamario Asciutta ima intramamarne šprice po sistemu „Twininsert“\*.

Sistem „Twininsert“\* omogućava bilo parcijalno bilo potpuno uvlačenje kanile intramamarne šprice u kanal sise onako kako su to potrebe operatora.


Lječenje protiv mastitisa sa djelimičnim uvlačenjem kanile u kanal sise dozvoljava da se znatno smanji nastup novih mamelarnih infekcija/mastitisa.

U stvari, potpuno uvlačenje kanile dilatira sfinkter bradavice/sise pospješujući ulaz bakterija i istovremeno, može dovesti bakterije koje se nalaze u sloju keratina koji pokriva otvor u bradavici/sisu direktno u kanal bradavice/sise.

Kod djelimičnog uvlačenja, kanila ušavši samo par milimetara u kanal sise, izbjegava dilataciju sfinktera, oštečenje sloja keratina i osim toga polaganje antibiotika i duž cijelog kanala bradavice/sise.

Kod krava koje su vrlo nervozne, i kada postoje lezije/povrede bradavice/sise ili u ostalim posebnim situacijama, potpuno uvlačenje kanile može se pokazati lakšim/povoljnijim.

#### **DJELIMIČNO DAVANJE LJEKA (grafičke ilustrcije)**



#### **8. KARENCA/VRIJEME ČEKANJA**

**Krave i bivolice**

**Meso i iznutrice : 0 dana.**

Ne koristiti za ishranu vime tretiranih životinja.

**Mlijeko:** 0 sati (0 muže).

#### **9. POSEBNE MJERE OPREZA ZA ČUVANJE**

Držati izvan dohvata djece.

Čuvati dugo na hladnom.

Zaštiti od svjetla.

Rok upotrebe veterinarskog ljeka u originalnom pakovanju za prodaju: 3 godine.

Ne koristiti nakon isteka roka i datuma naznačenog na kutiji.

#### **10. POSEBNA UPOZORENJA**

**Posebna upozorenja za primjenu kod sveke pojedine vrste životinja.**

Ne koristiti za ishranu vime tretiranih životinja.

Lječenje ne smije biti primjenjenu periodu od 7 sedmica prije očekivanog teljenja.

**Posebne mjere opreza kod korištenja životinja**

Ukoliko je moguće lijek treba biti primjenjen na bazi rezultata antibiograma.

Neodgovarajuća primjena proizvoda može dovesti do povećanja dominacije bakterija otpornih na rifaximina.

Treba se posvetiti posebna pažnja poboljšanju uvjeta uzgoja da bi se izbjeglo bilo kakve situacije stresa.

Često ponovno korištenje ili nastavak rifaximina treba izbjegći, poboljšavajući uvjete držanja i dezinfekcijom.

**Posebne mjere opreza koje treba primjeniti osoba koja daje lijek životinjama**

Osobe koje imaju poznatu osjetljivost na riflaximina ili druge ansamicine trebaju izbjegavati kontakt sa proizvodom.

U slučaju slučajnog kontakta oprati pažljivo i dobro ruke i ostale dijelove kože sa kojim je proizvod došao u kontakt.

U slučaju slučajnog kontakta sa očima ili sluzokožom, isprati odmah i dugo s vodom.

**Primjena tokom trudnoče, dojenja ili ovulacije**

Proizvod se koristi tokom trudnoće u periodu zasušenja vimena mlječnih krava.

**Interakcija sa ostalim veterinarskim ljekovima te ostali oblici interakcije**

Nije poznata.

**Predoziranje (simptomi, procedura hitne pomoći, protuotrovi)**

Nisu uočeni simptomi predoziranja koji se odnose na pprimjenu ovog ljeka.

**Inkompatibilnost/nepodnošenje**

Nije uočena.

**11. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE/UNIŠTAVANJE NEKORIŠTENOG PROIZVODA ILI EVENTUALNIH OSTATAKA**

Svi neiskorišteni veterinarski ljekovi ili njihovi otpatci trebaju biti uklonjeni u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/03) i odloženi u dogovorene odgovarajuće sisteme za prikupljanje i uništavanje za neiskorištene ljekove ili one kojima je prošao rok za upotrebu.

**OSTALE INFORMACIJE**

FATROMIXIN Endommamario Asciutta je proizvod na bazi riflaximina, antibiotik sinteze koja pripada porodici ansamicina. Mehanizam djelovanja rifaximina se izražava putem interakcije sa RNA polimerasi DNA koja zavisi od konsekventnog blokiranja sinteze proteina.

Spektar djelovanja rifaximina podrazumijeva osnovne bakterije odgovorne za mastitis goveda: *Staphylococcus aureus* (uključujući i one koji su rezistentni na penicilin), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Actinomyces pyogenes*. Provedena farmakokinetička istraživanja otkrivaju prelaz gotovo neznatan preko endromammelarnog epitela, dozvoljavajući, dakle, optimalni učinak rifaximina na nivou dijela koji se tretira.

Formulacija FATROMIXIN Endommamario Asciutta je takva da predstavlja visok stepen stabilnosti i viskoziteta konstantnog i pri različitim temperaturama ambijenta.

Posebne karakteristike ograničenja korištenog u formulaciji dozvoljavaju kompletni i trenutni prenos aktivnog principa tvari.

**Način izdavanja lijeka :**

Izdaje se na veterinarski recept.

Rok trajanja: 3 godine

**Pakovanje**

Kutija sa 4 intramammelarne šprice „Twininsert“ od 5 ml

Kutija sa 12 intramammelarnih šprica „Twininsert“ od 5 ml

Kutija sa 60 intramammelarnih šprica „Twininsert“ od 5 ml

**Broj Rjesenja registracije:** UP-I-06-2-20/21-403/20 J.B; od 04. juna 2020. godine

**VLASNIK I PROIZVOĐAČ:** FATRO SPA 40064 OZZANO EMILIA (BO) ITALY

**DISTRIBUTER LIJEKA:** SINTOFARM ADRIATICA D.O.O ORASJE BiH

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)