

PINOX 1250,0 mg

pjenušave komprete za intrauterinu upotrebu

Oksitetraciklin hidrohlorid 1250,0 mg

Samo za upotrebu u veterinarstvu

Naziv veterinarsko medicinskog proizvoda

Pinox pjenušave komprete za intrauterinu upotrebu

Oksitetraciklin hidrohlorid 1250,0 mg

Sastav

Svaka kompreta sadrži aktivnu supstancu:

Oksitetraciklin hidrohlorid 1250,0 mg

Pomoćne tvari: natrij hidrogenkarbonat, mikrokristalna celuloza, anhidrovana citrična kiselina, magnezij stearat, natrij laurilsulfat

Indikacije

Pinox pjenušave komprete namijenjene su za intrauterinu upotrebu u liječenju akutnih puerperalnih endometritisa, zaostajanja posteljice, fetotomija, carskih rezova, kao i prevencije upalnih procesa (endometritis i piometra) odmah nakon poroda, uzrokovanih vrstama mikroba osjetljivih na oksitetraciklin.

Oksitetraciklin je bakteriostatski antibiotik s antimikrobnim djelovanjem vezanim za inhibiciju sinteze proteina u ribozomima bakterija. Oksitetraciklin ima širok spektar djelovanja protiv gram-negativnih mikroorganizama (Enterobacteriaceae, Pasteurella, Bordetella, Haemophilus, Moraxella, Branhamella, itd.) i Gram-pozitivnih (aerobni koki, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria, itd.), sporulirajućih i ne – sporulirajućih anaeroba (Clostridium spp, neke vrste Bacterioides spp, Fusobacterium necrophorum, Peptostreptococcus spp), kao i Mycoplasma rickettsial, Erlichia, Chlamydia itd. Oksitetraciklin ima i određeno antiprotazoalno djelovanje. Ne djeluje na Ps. aeruginosa i većinu vrsta iz skupine Proteus - Providentia - Morganella, te neke vrste Bacterioides spp.

Kontraindikacije

Oksitetraciklin hidrohlorid je kontraindiciran kod životinja osjetljivih na njega ili na druge tetracikline. Lijek se ne upotrebljava kod gravidnih i životinja čije je mlijeko namijenjeno ishrani ljudi i životinja.

Neželjene reakcije

Nisu poznate.

Rizik od nuspojava je zanemariv zbog specifične metode primjene (intrauterine) i sigurnosnog profila proizvoda.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/80).

Ciljane vrste

Krave, kobile, mazge, ovce, koze, svinje

Doziranje i način primjene

Koristi se kada je grlić maternice otvoren. U slučaju suhoće maternice 300 ml izotonične otopine NaCl, zagrijane na 38 °C, treba infuzirati istodobno s primjenom komprete.

Doze za liječenje:

Krave, kobile, mazge - 1 - 2 komprete svaka 24 sata tokom 3-5 dana.

Ovce, koze, svinje - 1 kompreta svaka 24 sata tokom 3-5 dana.

Doze za prevenciju:

Krave, kobile, mazge - 1-2 komprete

Ovce, koze, svinje - 1 kompreta

Profilaktički tretman treba obaviti odmah po rođenju i ponoviti ako je potrebno nakon 24 sata.

U slučaju septikemije i općih infekcija istovremeno s kompretama treba propisati odgovarajući tretman sistematskim unošenjem odgovarajućih antiinfektivnih lijekova.

Savjeti za ispravnu upotrebu

U slučaju potrebe, posebno kod malih preživara /ovaca i koza/ i svinja koristiti lubrikant.

Karenca

Meso i organi (za prehranu ljudi): najmanje 72 sata (3 dana) nakon posljednjeg tretmana.

Meso životinja koje su uginule ili su zaklane u hitnim slučajevima tokom liječenja ne smije se koristiti za ljudsku upotrebu.

Mlijeko:

Lijek nije dozvoljen za upotrebu kod životinja koje proizvode mlijeko za prehranu ljudi I životinja koje služe u ishrani ljudi (osobito podmlatka),

Inkomatibilnost

Nije poznata

Korištenje tokom gravidnosti, laktacije

Graviditet:

Nije primjenjivo (za vrijeme cjelokupnog trajanja graviditeta)

Laktacija:

Primjenjivo.

Nije dopušteno za upotrebu u laktaciji kod životinja koje proizvode mlijeko za prehranu ljudi.

Predoziranje (simptomi, hitne procedure, antidoti)

Rizik od predoziranja je zanemariv zbog specifične metode primjene (intrauterine) i sigurnosnog profila proizvoda.

Posebni uslovi skladištenja

Čuvati na temperature ispod 25°C

Čuvati u originalnom pakovanju

Čuvati na suhom mjestu

Držati dalje od direktne sunčeve svjetlosti

Posebne mjere za upotrebu

Posebne mjere za upotrebu kod životinja:

Upotreba ovog proizvoda mora biti u skladu sa zahtjevima službenih i lokalnih propisa za upotrebu antibiotika.

Zloupotreba proizvoda i nepridržavanje uputa navedenih u SPC (Sažetak karakteristika proizvoda) mogu povećati bakterijsku otpornost na tetracikline i time smanjiti učinkovitost liječenja.

Ako je potrebno, posebno kod malih preživara / ovaca i koza / i svinja koristiti lubrikante.

Koristi se pri otvorenosti grlića maternice.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja daje veterinarsko medicinsko sredstvo životinjama

Tokom upotrebe koristiti sterilne rukavice u svrhu izbjegavanja infekcije i preosjetljivost na tetracikline. Oprati ruke nakon upotrebe. Tokom upotrebe ne jesti, piti i ne pušiti.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal

VMP (veterinarsko medicinski proizvod) ne treba odlagati sa kućnim otpadom ili otpadnom vodom.

Pitajte svog veterinara kako odložiti nepotrebni VMP. Ove mjere će pomoći zaštititi okoliša.

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom Sl.novine FBiH br.33/03)

Broj i datum odobrenja:

UP-I-06-2-20/21-646/20 J.B.; od 04. juna 2020. godine

Način izdavanja

Izdaje se na recept

Pakovanje

Kutija 40 kompreta

Proizvođač: Golashpharma Ltd Bulgaria , Sapareva Bana, ul.Pobeda 33, obl.Konstendil, Bugarska.

tel:+359 888 300 755

Uvoznik za BiH:

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica , Bosna i Hercegovina

tel: 032/423-196; fax: 032/423-194