

**Bovilis BVD**, inaktivirana vakcina, suspenzija za injekciju, u bočici od jedne doze od 2 ml ili višedoznoj bočici od 10/20/50/100 ili 250 ml.

(za primjenu u veterinarstvu)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahtjeva: Intervet International bv, Predstavništvo za BiH

Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

## IME LIJEKA

Bovilis BVD

## KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Doza od 2 ml sadrži:

Aktivna tvar: Inaktivirani antigen citopatogenog BVD virusa, soj C-86, 50 Elisa jedinica (EU), koji inducira najmanje 4.6 log<sub>2</sub>VN jedinica

Adjuvans: AL3+ (u obliku Al-fosfata i Al-hidroksida) 6-9 mg

Konzervans: Metil parahidroksibenzoat 3 mg

Tragovi antibiotika i telećeg seruma kao ostataka od proizvodnje antigena.

## INDIKACIJE

Bovilis BVD je inaktivirana vakcina za aktivnu imunizaciju goveda protiv fetalne infekcije virusom goveđe dijareje (BVDV).

Bovilis® BVD sadrži imunogeni soj citopatogenog virusa BVD. Soj virusa se uzgaja u ćelijskim kulturama. Nakon inaktivacije, antigen se adsorbuje na aluminijumske soli kako bi se postigla produžena stimulacija imunog sistema.

## CILJNA VRSTA

Goveda u dobi 8 mjeseci i stariji.

## KONTRAINDIKACIJE

Nisu primjećene.

## NUSPOJAVE

Jedva opipljivo oteknuće na mjestu aplikacije, u trajanju od 14 dana nakon urizgavanja.

**U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70/08).**

## DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Svakoj životinji treba dati 2 ml vakcine intramuskularnom injekcijom.

### Preporučeni program vakcinacije

Bovilis BVD treba dati govedima u dobi od osam mjeseci i starijima. Za primarnu vakcinaciju, životinjama treba dati jednu dozu (2 ml) otprilike 2 mjeseca prije prve steonosti, a zatim izvršiti dovakcinaciju (2 ml) 4 sedmice kasnije.

Preporučuje se revakcinacija jednom dozom (2 ml), otprilike 4 sedmice prije svake naredne steonosti.

U slučaju ekstenzivnog stočarstva, preporučuje se alternativni program vakcinacije. Prva doza vakcine Bovilis BVD (2 ml) primjenjuje se na svim govedima starijim od 8 mjeseci, nakon čega se 4 sedmice kasnije vrši dovakcinacija. Nakon ovih primarnih vakcinacija, sve životinje na farmi se revakcinišu nakon 6 mjeseci, a naredna revakcinacija je u intervalu ne većem od 12 mjeseci.

#### **NAPOMENA**

Kod zdravih životinja neće se javiti nikakve kliničke reakcije na vakcinaciju. Može se osjetiti blago oteknuće na mjestu vakcinacije u trajanju od 1 do 2 sedmice.

Vakcinisati samo zdrava goveda. Prije upotrebe pustiti da se vakcina izjednači sa sobnom temperaturom (15-25°C). Prije upotrebe dobro protresti bočicu. Koristiti sterilnu opremu za ubrizgavanje. Ne miješati sa drugim vakcinama.

#### **KARENCA**

0 dana.

#### **POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA**

Čuvati od 2 do 8°C. Ne zamrzavati. Držati van dohvata djece.

#### **POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA**

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpada ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

#### **BROJ I DATUM ODOBRENJA**

UP-I-06-2-20/21-1200/20 J.B; od 15. oktobra 2020. godine

**PAKOVANJE:** Bočica od jedne doze od 2 ml ili višedozna bočica od 10/20/50/100 ili 250 ml od stakla.

**NAČIN IZDAVANJA:** Na veterinarski recept.

**ROK UPOTREBE:** 18 mjeseci.

**ATC vet kod:** QI02AA01

#### **NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

#### **NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LIJEKA**

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanjka 24 A, Sarajevo