

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

AMPROVIL

Oralna Otopina

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 ml otopine sadrži: 226,19 mg Amprolyum HCl što je ekvivalent 200 mg Amprolium baze.

OBLIK

Oralna otopina

CILJNE VRSTE

Perad

INDIKACIJE

Amprovil oralna otopina se upotrebljava za zaštitu i liječenje kokcidioze tankog crijeva, debelog crijeva i slijepog crijeva kod kokoški koje su zaražene od *Eimeria tenella* i *E. Necatrix*, *E. Acervulina*, *E. Maxima*, *E. Brunetti* te kod ćurki koje su zaražene *E. Adenoides*, *E. melearidis*, *E. dispersa*.

KONTRAINDIKACIJE

Lijek se ne koristi u periodu vakcinacije pilića putem vode za piće. Lijek se ne upotrebljava u kombinaciji sa drugim antikokcidijskim preparatima.

Životinje se ne smiju tretirati sa drugim antibioticima ili kokcidiostaticima u toku terapije sa ovim preparatom. Obratiti pažnju na dezinfekciju pojilica ili objekta, ili prisustvo hlora u vodi za piće, koji se mora primjenti na ispravan način, po uputstvu proizvođača.

NEŽELJENI EFEKTI

U slučaju predoziranja moguća je prolazna zbunjenost.

Kod jednog dijela pilića koji izlaze iz jaja koka koje su uzimale Amprovil može se primijetiti sićušnost. Pošto je Amprolium, koji je aktivna tvar u Amprovil Oralnoj Otopini, antagonist Thiaminu (B vitaminu) može doći do gubitka B vitamina, da bi se to spriječilo preporučuje se dodatno pojačavanje Thiamina.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70 /08).

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Ukoliko veterinar nije drugačije preporučio Amprovil Oralna Otopina se oralno upotrebljava dodajući u pitku vodu za perad.

Farmakološka doza: Daje se peradima dnevno po 40 mg/kg žive mase.

Praktična doza: U liječenju kokcideoze, 60 ml Amprovil Oralne otopine dodaje se u 50 L pitke vode. Prvih sedam dana implementira se ova doza. U nastavku doza se smanjuje na pola i nastavlja se još sedam dana.

Zaštitni tretman: Na 1L pitke vode potrebno je da dođe 60 mg Amprolium aktivne materije.

Praktična primjena, preporučuje se da na 1 tonu vode pomiješa 300 ml Amprovil Oralne Otopine.

Tokom programa zaštite životinjama se daje samo voda sa lijekom.

Liječenje bi se trebalo zasnivati na rezultatima parazitoloških pregleda fecesa. Ukoliko je rezistencija na amprolium evidentna iz rezultata ispitivanja trebalo bi upotrijebiti antikokcidiijalne lijekove koji pripadaju drugoj farmakološkoj klasi i sa različitim mehanizmima djelovanja.

Kao i kod svih antokocidijalne lijekove dugotrajna upotreba može izazvati selekciju rezistentnih vrsta.

Da bi se izbjeglo ili odgodilo nastupanje otpornosti, izbjegavati da se antokocidijalni lijekovi nađu u vodi ili u hrani u koncentracijama većih od propisanih ili u dužem periodu od propisanog.

Kada je sadržaj tiamina (vitamin B1) u ishrani visok, moguće je da će doći do smanjenog djelovanja aktivnosti antokocidijalnih lijekove. Također ako je amprolium prisutan u ljekovitoj vodi u visokim koncentracijama, odnosom u nepropisanim koncentracijama, kod domaćina može doći do nedostatka tiamina. Ne mješati sa čvrstom hranom.

KARENCIJA

Lijek se ne smije upotrebljavati u periodu od 7 dana pred klanje.

Brojlerski pilići: meso i iznutrice: 3 dana

Lijek se ne smije primjenjivati nakon 16 sedmice života kod koka nesilica.

Kokoši nesilice: jaja: 10 dana.

ČUVANJE I ROK TRAJANJA

Čuvati na tamnom mjestu i na sobnoj temperaturi (15-20°C).

Rok trajanja 2 godine od datuma proizvodnje.

MIJEŠANJE LIJEKA

Amprolium sa Thiaminom pokazuje antagonističko djelovanje. Thiamin umanjuje antokocidijalno dejstvo Amproliuma. Amprolium je sinergičan sa etopabatom. Posebno ima jako dejstvo protiv E.maksime. Sinergičan je i sa sulfakinoksalinom. Pojačava mu se dejstvo protiv svih vrsta kokcidija.

MJERE OPREZA I NUSPOJAVE

Niska toksičnost, granica tolerancije je široka. Ukoliko je potrebno može se stalno koristiti. Kod prekoračenja 2-4 puta i više preporučene doze i implemtacija nekoliko sedmica može dovesti do gubitka na težini, nemoć u nogama vezana za nedostatak vitamina B1 kao i atakcija, opistotonus i sl. Farmakološka antidota je B1 vitamin. Preporučuje se da na 1 kg tjelesne težine u hranu ili pitku vodu doda 1 – 10 mg B1 vitamina.

MJERE OPREZA KOD LJUDI

Izbjegavajte kontakt sa lijekom. Posle upotrebe ruke dobro isprati.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKÉ PROIZVOĐE ILI OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišten veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se uz veterinarski recept.

PAKOVANJE

Kartonske kutije, polietilenske boce od 100 ml, 500 ml, 1L, 3L i 5L.

NOSILAC DOZVOLE I MJESTO PROIZVOĐAČA

VILSAN veteriner ilaclari Tic.San. A.S.

Balikhisar mah. Koy ici Kumeevleri No: 765A Akyurt/ANKARA

Tel: 0090 312 827 18 40

DATUM ODOBRENJA PROSPEKTA: 12.06.2006.

MINISTARSTVA ZA HRANU, POLJOPRIVREDU I STOČARSTVO REPUBLIKE TURSKE:

Broj i datum licence: 16-026/od 12.06.2006.

UVOZNIK ZA BiH

**„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: 035/819-523**

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-20/21-86/21 J.B. od 07.05.2021.godine