

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**  
**KALSİMİN**  
**Injekcijska Otopina**  
**Za upotrebu u veterini**

**SASTAV**

100 ml injekcijske otopine sadrži:

Kalcijum glukonata	45 g
Kalcijum gluukoheptonata	2 g
Kalcijum hipofosfita	2 g
Kalcijum D-sakkarata	1 g
Magnezijum hlorida	3 g

**OBLIK**

Injekcijska otopina

**INDIKACIJE**

Lijek se upotrebljava kod raznih uzroka hipokalcemije i to:

Porodajna groznica, mliječna tetanija, hipomagnezijski grčevi, transportna i pašna tetanija, rahitis, osteomalacija, hypokalcemija kod mladih životinja pri razvoju, pri smanjenju reproduktivnih sposobnosti, hematurija, alergije, trovanja hloroformom, organofosornim insekticidima, karbontetrahloridom, osobito živom, olovom, bakrom, kalajem, kadmijom i drugim metalima, kao i kod nervnih poremećaja, te morbus maculosus, serumske bolesti, anafilaksije, exantema hemoragične dijateze i dr.

**KONTRAINDIKACIJE**

Ne smije se koristiti u slučaju zatajenja srca, hiperkalcemije i hiperkalciurije.

**NEŽELJENI EFEKTI**

Nakon intravenozne primjene kalcija, nepravilnost u radu srca, bradikardija, blokada srca, mučnina, povraćanje i promjene na mjestu tretiranja su moguće pojave. Međutim, kod intramuskularnog i potkožnog apliciranja nuspojave su veoma rijetke.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

**DOZIRANJE I PRIMJENA**

Ne tretirati osim ako nije preporučio veterinar.

Tabela doziranja:

Goveda	(200-500 kg žive vage)	80-100 ml
Konj	(200-500 kg žive vage)	80-100 ml
Ovca, Koza	(25-50 kg žive vage)	15-25 ml
Svinja	(50 kg žive vage)	15ml

Primjenjuje/tretira se: Intravenozno, intramuskularno i subkutano

Kalsimin Injekciona Otopina se tretira intravenozno sporim tempom, subkutane i intramuskularne aplikacije se vrše u 3-4 podijeljene doze.

**KARENCIJA:**

Mlijeko i meso: "0" dana.

**UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA**

Rok trajanja je 3 god od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Skladištite na temperaturi (15-25°C).

**SIMPTOMI PREDOZIRANJA I MJERE OPREZA**

Soli Kalcijuma su otrovi za srce. Kod intravenoznog davanja treba pratiti rad srca. U slučaju povećanja rada otkucaja srca treba prekinuti sa terapijom. Ako je riječ o trovanju kalcijumom tretirati sa 10% magnezijum sulfatske otopine (300 ml). (kod normalne veličine goveda), intravenoznim tretiranjem se sprečava trovanje.

**MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU**

Izbjegavajte kontakt sa lijekom, nakon upotrebe isprati ruke.

**SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKÉ PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL**

**Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).**

**PRIMJENA LIJEKA:** Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“)

**PAKOVANJE**

Bezbojne bočice od 50, 100 i 250 ml.

**PROIZVOĐAČ**

**VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.**

Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA

Tel: 03128271840

Datum odobrenja prospekta: 29.09.2004

**MINİSTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNIH POSLOVA REPUBLIKA TURSKA**

**BROJ I DATUM LICENCE: 17.10.1995-8/736**

**UVOZNIK ZA BiH**

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 035/819-523

**BROJ I DATUM RJEŠENJA:**

**UP-I-06-2-20/21-439/21 J.B. od 07.05.2021.**