

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAKROVIL

Oralna Otopina

Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 ml otopine sadrži Tilmikosin fosfat ekvivalent 250 mg Tilmikosin bazi.

TERAPIJSKA OBLIK

Oralna otopina;

CILJNE VRSTE

Tovljene kokoške i čurke

INDIKACIJE

MAKROVIL Oralna Otopina koristi se kod tovljenih kokoški i čurki za liječenje infekcija disajnog sistema koje izazivaju *Mycoplasma gallisepticum*, *M.synovia*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida* i drugi osjetljivi mikroorganizmi.

KONTRAINDIKACIJE

Upotreba u preporučenim dozama na ciljnim vrstama oralnim putem ne izaziva kontraindikacije. Ne treba koristiti kod drugih vrsta životinja. Ne treba upotrebljavati kod životinja sa oštećenom jetrom. Ne treba miješati Makrovil Oralnu Otopinu sa drugim otopinama. Fenikole, linkozamide i druge makrolidne antibiotike zbog antagonističkog djelovanja.

NEŽELJENI EFEKTI

Nisu primijećeni neželjeni efekti prilikom upotrebe preporučene doze Tilmikosina. U eksperimentima na laboratorijskim životinjama i domaćim životinjama primijećeno je toksično dejstvo na srčanom mišiću. Može izazvati tahikardiju i negativni inotropni efekat.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/98 i 70 /08).

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

MAKROVIL Oralna Otopina koristi se oralno dodajući u pitku vodu.

Farmakološka doza: dnevna doza je 15 – 20 mg/kg žive mase, sve se dodaje u dnevnu količinu pitke vode.

Praktična doza: 60 ml Makrovil Oralne otopine dodaje se na 200 litara vode. Treba implementirati 3 dana. 1 – 2 dana posle nestanka simptoma nastaviti sa implementacijom. Vodu sa lijekom treba svaki dan osvježavati.

Ukoliko je rezistencija na Tilmikosin evidentna iz rezultata ispitivanja trebalo bi upotrijebiti lijekove koji pripadaju drugoj farmakološkoj klasi i sa različitim mehanizmima djelovanja.

Kao i kod svih lijekove dugotrajna upotreba može izazvati selekciju rezistentnih vrsta.

Da bi se izbjeglo ili odgodilo nastupanje otpornosti, izbjegavati da lijekovi nađu u vodi ili u hrani u koncentracijama većih od propisanih ili u dužem periodu od propisanog.

PREKORAČENJE DOZE I MJERE OPREZA

Prekoračenje doze povećava opasnost od srčanog trovanja. Nije poznata specifična antidota.

Nepreporučuje se antagonisti beta adrenergetik kao što je propranolol zbog toga što, iako smanjuje tahikardiju slabi srčani mišić.

KARENCIJA

Za vrijeme liječenja i nakon 5 dana od zadnje upotrebe lijeka tovljena perad ne treba slati u klaonicu. Ne smije se upotrebljavati kod kokoški i ćurki čija se jaja koriste u ishrani.

ČUVANJE I ROK TRAJANJA

Čuvati na tamnom mjestu i na sobnoj temperaturi (15-25 °C).
Rok trajanja 2 godine od datuma proizvodnje.

MIJEŠANJE SA DRUGIM LIJEKOVIMA

Ne treba miješati Makrovil Oralnu Otopinu sa drugim otopinama. Fenikole, linkozamide i druge makrolidne antibiotike zbog antagonističkog djelovanja - ne treba zajedno implementirati.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

NAČIN IZDAVANJA

Izdaje se uz veterinarski recept.

PAKOVANJE

Kartonska kutija; 240 ml, 480ml i 960 ml u polietilenski bocama i 240 ml 480 ml 960 ml u staklenim bocama.

NOSILAC DOZVOLE I MJESTO PROIZVOĐAČA

VILSAN veteriner ilaclari Tic.San. A.S.
Balikhisar mah. Koy ici Kumeevleri No: 765A Akyurt/ANKARA
Tel: 0090 312 827 18 40

DATUM ODOBRENJA PROSPEKTA: 09.10.2007.

MINISTARSTVA ZA HRANU, POLJOPRIVREDU I STOČARSTVO REPUBLIKE TURSKE:

Broj i datum licence: 18/101 od 09.10.2007.

UVOZNIK ZA BiH

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina
Tel/fax: 035/819-523

BROJ I DATUM RJEŠENJA:

UP-I-06-2-20/21-88/21 J.B. od 07.05.2021.godine

