

Nobilis E. Coli inac₅, inaktivirana vodeno-uljna emulzija za injekciju od 1000 doza (500 ml)

(za primjenu u veterinarstvu)

Proizvođač: Intervet International bv

Adresa: Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holandija.

Podnositelj zahteva: Intervet International bv, Predstavništvo za BiH

Adresa: Tešanska 24 A, Sarajevo.

IME LIJEKA

Nobilis E. coli inac

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Emulzija sadržava aktivne tvari po dozi od 0,5 ml:

F 11 – antigen sadržava 100 µg

FT – antigen sadržava 100 µg

Vakcina sadrži 0,05% w/v formaldehida kao konzervansa.

Aktivni sastojci su fimbrijalni F11-antigen i flagelami toksin (FT). Oba antigena su umiješani u virulenciju sojeva E.coli koji izazivaju kolibacilozu kod peradi. Antigeni su sadržani u emulziji voda u ulju kako bi se pojačala produžena stimulacija imuniteta.

INDIKACIJE

Vakcinacija roditeljskih jata protiv kolibaciloze u cilju prenosa antitijela (pasivna imunizacija) na potomstvo (brojleri). Ova antitijela pomažu u zaštiti embrija i brojlera protiv efekata kolibaciloze.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

CILJNE VRSTE

Roditeljska jata brojlera.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Ubrizgati 0,5 ml po ptici subkutano u stražnju stranu vrata ili intramuskularno u grudni mišić.

PROGRAM VAKCINACIJE

Rasplodne kokoši se trebaju vakcinisati u dobi od 6-12 sedmica. Vakcinaciju ponoviti u dobi od 14-18 sedmica. Pauza između vakcinacija mora biti najmanje 6 sedmica.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod zdravih ptica neće biti nikakve sistemske reakcije na vakcinaciju koja se provede aseptično. Nekoliko sedmica nakon vakcinacije može se osjetiti blaga oteklina na mjestu vakcinacije. Mogu se javiti i lokalne reakcije tkiva.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu
(“Službene novine Federacije BiH”br. 15/98 i 70/08)

KARENCA

„0“ dana.

POSEBNA UPOZORENJA

Vakcinisati samo zdrave ptice. Prije upotrebe omogućiti da se temperature vakcine izjednači sa sobnom temperaturom. Bočicu protesti prije i ponekad tokom vakcinacije. Koristiti sterilnu špricu i iglu. Otvorene boćice treba iskoristiti u roku od 10 sati. Ukoliko lice koje vrši vakcinaciju slučajno ubrizga sadržaj u sebe ili drugu osobu, može se javiti lokalna reakcija. Preporučuje se potražiti savjet doktora pri čemu ga je potrebno informisati da je vakcina emulzija voda u ulju.

Ne kombinovati sa drugim vakcinama ili lijekovima, jer to nije ispitivano.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpada ("službene novine Federacije BiH" broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-20/21- 213/21 J.B; od 11. 05. 2021. godine

OSTALI PODACI

Pakovanje: Bočica od 500 ml (1000 doza)

Čuvanje: Čuvati na temperaturi od 2-8 C°. Čuvati van dohavata dece.

Rok upotrebe: 2 godine; otvorena boca 10 sati.

Način primjene: Aplikaciju lijeka može vršiti samo dr vet.med., odnosno diplomirani veterinar (*Ad manum veterinarii*).

ATC vet kod: QI01AB05

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet International bv, Boxmeer, Holandija.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Intervet International bv, Predstavništvo za BiH, Tešanjska 24 A, Sarajevo.