

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU  
PENOKSAL  
Injekcijska suspenzija  
Za upotrebu u veterinarstvu**

**SASTAV**

1 ml injekcijske suspenzije sadrži:

Prokain penicilina G	200.000 i.j.
Dihidrostreptomicin sulfata	250 mg

**OBLIK**

Injekcijska suspenzija

**INDIKACIJE**

Lijek se upotrebljava kod konja, goveda, ovaca, svinja i pasa kod pojave infekcija (sistemske i lokalne) u probavnom, disajnom i uro – genitalnom traktu, kao i sekundarne bakterijske infekcije.

**KONTRAINDIKACIJE**

Peniciline, cefalosporine i dihidrostreptomicine ne koristiti: kod osjetljivih životinja i sa izrazito oslabljenom funkcijom bubrega. Ne treba davati intravenozno.

Upotreba u gestaciji: Dihidrostreptomicin na fetus može djelovati neurotoksično, nefrotoksično i ototoksično te ga treba izbjegavati.

**NEŽELJENI EFEKTI**

Urtikarija kod osjetljivih životinja, lezije kože, mučnina, povraćanje, otežano disanje, edem pluća i grkljana, centralnuparalizi vazotomije, koma, alergijske i anafilaktičke reakcije kao i oblike smrtnosti. Posebno kod životinja sa oslabljenom funkcijom bubrega, ovisno o dozi i količini streptomicina i visoke koncentracije plazme mogu se pojaviti posljedice neurotoxica, nefrotoksičnosti i ototoksičnosti. Kod slučajeva sa oslabljenim funkcijama bubrega treba smanjiti dozu.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08)

**DOZIRANJE I PRIMJENA**

Ne preporučuje se tretiranje nikom osim doktoru veterinarske medicine;

Pratična doza: 1 ml / 20 kg / žive vage / doza se primjenjuje intramuskularno.

Govedo/Konj	(400 kg žive vage)	20 ml
June	(200 kg žive vage)	10 ml
Tele/ždjebe	(100 kg žive vage)	5 ml
Ovca	(40 kg žive vage)	2 ml
Svinje	(40 kg žive vage)	2 ml
Pas	(10 kg žive vage)	0,5 ml

Prije upotrebe bocu dobro protresite, suspenziju treba homogenizirati

Intravenozni davanje je kontraindicirano.

Kada koristite treba slijediti asepsu i antisepsu.

Pogotovu kod konja treba izbjegavati tretiranje na istom mjestu.

Ako je potrebno, liječenje treba nastaviti kroz period od 3-4 dana.

**UPOZORENJA ZA TRETIRANJE NE CILJANIH VRSTA**

Kao i kod ostalih penicilina: hrčci, zecovi, zamorci i ostali mali biljojedi, ptice plivačice, patke i guske ne smiju da budu tretirane. Mačke su također puno osjetljivije od drugih vrsta na streptomicin. Stoga streptomicin preparati ne smiju se koristiti na mačke.

**KARENCIJA:**

Meso i organi goveda i ovaca: 60 dana.

Meso i organi svinja: 21 dan

Lijek se ne upotrebljava kod konja čije se meso i organi koriste u ishrani ljudi.

Lijek se ne upotrebljava kod životinja (kobile, krave i ovce) čije se mlijeko upotrebljava u ishrani ljudi.

**UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA**

Rok trajanja je 2 godine od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Skladištite na temperaturi (15-25°C), ili u hladnjaku na +(4 ° C).

Nakom prve upotrebe, ako se čuva u kartonskoj kutiji i u preporučenim uvjetima može se koristiti u roku od 28 dana.

#### **SIMPTOMI PREDOZIRANJA , MJERE I OPREZI**

Kada se koristi prekomjerno od preporučene doze ili sa rokom trajanja koji je istekao posljedice koje mogu da se dese je nepovratna i neizlječiva gluhoća. U slučaju pojave osjetljivosti, odmah prekinuti terapiju, prema uobičajenoj kliničkoj slici, treba započeti srčane i respiratorne analeptike, antihistaminike, kortikosteroide i adrenalinsko liječenje.

#### **MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU**

Izbjegavajte kontakt sa lijekom i uvijek operite ruke nakon primjene lijekova. Osobe za koje se zna da su osjetljive na penicilin i cefalosporin lijekove, ne bi trebale dirati niti na bilo koji način koristiti. Ako su osobe osjetljive na oralnu primjenu, nakon izlaganja na kožu ili inhalaciono, otekline na usnama, licu ili očima otežano disanje i sl. trebaju se odmah obratiti za hitnu liječničku pomoć. U ovom slučaju ponijeti deklaraciju sa lijekom i pokazati je liječniku.

#### **SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL**

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03).

**PRIMJENA LIJEKA:** Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“)

#### **PAKOVANJE**

Tamna bočice od 20, 50, 100 i 250 ml, u kartonskoj kutiji.

#### **PROIZVOĐAČ**

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.

Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA

Tel: 03128271840

Datum odobrenja prospekta: 24.06.2004

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNIH POSLOVA REPUBLIKATURSKA

BROJ I DATUM LICENCE 21.08.2000-10/901

#### **UVOZNIK ZA BiH**

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 035/819-523

#### **BROJ I DATUM RJEŠENJA**

UP-I-06-2-20/21-433/21 J.B. od 07.05.2021.