



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)

**REPEN 200.000 IU/ml – 250 mg/ml, injekcijska solucija, za goveda, konje  
(kopitare) koji nisu namjenjeni za ljudsku ishranu, svinje, ovce, koze, psi i  
mačke**

**SASTAV** 1 ml rastvora sadrži:

Benzilpenicillin procain što odgovara 200.000 IU benzil pencillina

Dihidrostreptomicin sulfat što odgovara 250 mg dihidrostreptomicina

Nosač do 1 ml

**ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA**

Goveda, svinje, ovce, koze, konji (kopitari) koji nisu namjenjeni za ljudsku ishanu, psi i mačke.

**DJELOVANJE**

Repen je kombinacija benzil penicillin procaina i dihidrostreptomicin sulfata u vodenom rastvoru, spremnom za upotrebu. Ova kombinacija omogućava njegovo produženo antibakterijsko djelovanje protiv infekcija uzrokovanih mješovitom bakterijskom florom.

Benzilpenicillin procain djeluje baktericidno i negativno utječe na razmnožavanje bakterija izazivajući njihove morfološke poremećaje. Djeluje na Gram + bakterije i na sve Gram - bakterije.

Dihidrosteptomicin sprečava sintezu bjelančevina u bakteriji i ima baktericidno djelovanje na Gram + i Gram - bakterije.

Njihovim sinergičnim djelovanjem sprečavaju rezistenciju bakterija na koje imaju baktericidan efekat.

**INDIKACIJE**

Repen se preporučuje kod infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na benzilpenicilin i dihidrostreptomicin sulfata, kao što su enteritisi, gastroenteritisi, aktinomikoze, leptospiroza, pleuritis, pulmonitis, bronhitis, artritis, mastitis i infekcija urogenitalnog trakta, kao i kod sekundarnih infekcija kod svih povreda. Primjena lijeka mora biti bazirana na testu osjetljivosti bakterija koje su izolirane kod životinja (antibiogram).

**KONTRAINDIKACIJE**

Ne koristiti kod konja (kopitara) koji služe za ishranu ljudi.

Ne koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena preosjetljivost na peniciline (anafilaktički šok).

Ne koristiti kod kunića i malih glodavaca.

Ne koristiti kod životinja sa insuficiencijom bubrega jer može doći do pojave nefrotoksičnosti i neurotoksičnosti.

## **NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE**

Intramuskularno i duboko.

- Kod goveda i konja 15-30 ml dnevno;
- Telad i ždredbad 5-10 ml dnevno;
- Svinje 10-15 ml dnevno;
- Prasad 3-5 ml dnevno;
- Ovce i koze 5-15 ml dnevno;
- Psi i mačke 2-10 ml dnevno.

## **POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI**

Primjena lijeka mora biti bazirana na testu osjetljivosti bakterija koje su izolirane kod životinja (antibiogram).

Ukoliko to nije moguće, terapiju treba bazirati na lokalnim epidemiološkim informacijama osjetljivosti bakterija na koje se cilja (region, uzbunjalište)

Primjena lijeka koji nije u skladu sa onim što je navedeno u ovom uputstvu može dovesti do umnožavanja bakterija koje su otporne na β laktame i aminoglikozide, te može dovesti do smanjenja djelotvornosti tretmana, sa mogućnošću pojave unakrsne rezistencije.

Učestalo korištenje Repena se izbjegava, poboljšanjem uslova držanja životinja, održavanjem čistoće u uzbunjalištu i redovnim provođenjem mjera DDD – a.

## **PREDOZIRANJE**

Nisu poznati simptomi kod predoziranja lijeka, ali uvijek se treba poštovati propisana doza lijeka.

## **NUSPOJAVE I UPOZORENJE**

Ne daje se životinjama osjetljivim na peniciline. Prije upotrebe preparat dobro promučkati.

Može se pojaviti unakrsna alergija između penicilina i cefalosporina.

U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinary mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH" br. 15/98 i 70/08).

Lijek se ne smije mješati sa drugim lijekovima.

## **PREDNOSTI**

Odličan odnos između ova dva antibiotika zbog njihovog sinergičnog djelovanja na mješovite bakterijske infekcije

## **KARENCA**

Meso goveda, svinja, ovaca i koza: 74 dana

Lijek se ne koristi kod goveda, kobila, ovaca i koza čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi i podmlatka.

Ne koristiti kod konja (kopitara) koji služe za ishranu ljudi.

## **NAČIN IZDAVANJA**

Na veterinarski recept.

## **NAČIN ČUVANJA**

Čuvati u suhom i prozračnom prostoru ispod 15°C..

## **ROK UPOTREBE**

2 godine. Nakon otvaranja primarnog pakovanja 28 dana

## **BROJ I DATUM ODOBRENJA:**

UP-I-06-2-20/21 – 2535/20 J.B; od 14. aprila 2021. godine

## **NAČIN PAKOVANJA**

100 ml boca

250 ml boca

## **POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTRIJEBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA**

S neiskorištenim lijekom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. Novine FBiH" 33/03).

## **PROIZVODAČ:**

FATRO SPA, Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy

## **DISTRIBUTER:**

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270

Orašje, BiH

Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)