

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
VIL-FLOKS
Ānjekcijska otopina
Za upotrebu u veterinarstvu

SASTAV

1 ml injekcijske otopine sadrži:

Enrofloksacina 100 mg

OBLIK

Injekcijska otopina

INDIKACIJE

Koristi se u terapiji bolesti respiratornih organa kod goveda i ovaca, te probavnih smetnji, kod bolesti uro – genitalnog trakta, bolesti kože i ostale infekcije mekog tkiva uzrokovanih bakterijama, te kod virusnih infekcija, za sprečavanje sekundarnih infekcija bakterijama.

KONTRAINDIKACIJE

Kontraindiciran je kod bolesnika sa oslabljenom funkcijom jetre i bubrega. Ne treba tretirati konje i mlade pastuve. Upotreba u gestaciji : ne preporučuje se tretiranje u gestaciji zbog mogućih nuspojava kvinolona.

NEŽELJENI EFEKTI

Tijekom razdoblja brzog razvoja, pogotovo kod mladih životinja mogu izazvati poremećaje kod zglobova, hrskavice. Kvinoloni mogu rijetko uzrokovati grčeve. Iz tog razloga ga treba oprezno tretirati kod životinja kod kojih je centralni nervni sistem osjetljiv. Neki kinoloni poput ciprofloksacina i enrofloksacina ponekad mogu dovesti do kristalizacije u urinarnom traktu. Iz tog razloga kada se tretira sa ovim lijekom ne treba uskraćivati unos tečnosti-vode kod životinja. U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”br. 15/98 i 70/08)

DOZIRANJE I PRIMJENA

Ne preporučuje setretiranje nikom osim doktoru veterinarske medicine;

Farmakološka doza: 2,5 mg/kg/žive vage / u dnevnoj dozi intramuskularno ili potkožno.

Prakrična doza: 2,5 ml/100 kg žive vage /dnevno

Stoka	400 kg žive vage	10,0 ml
Junica	200 kg žive vage	5,0 ml
Svinja	100kg žive vage	2,5 ml
Tele	100 kg žive vage	2,5 ml
Ovca	40 kg žive vage	1,0 ml
Janje	20 kg žive vage	0,5 ml

Liječenje se nastavlja tijekom perioda od 3-5 dana.

Teške i kronične infekcije: dozu treba povećati za 5 mg / kg .Na mjestu tretiranja, kod goveda ne treba tretirati više od 10 ml , te kod ovaca ne više od 5 ml, treba provesti na način da se ukupni iznos treba ubrizgavati na različitim mjestima.

KARENCIJA:

Meso goveda: 14 dana

Meso ovaca i svinja: 10 dana

Mlijeko goveda: 4 dana (8 muža)

Ne koristi se kod ovaca u laktaciji, čije mlijeko se upotrebljava za ljudsku ishranu.

UVJETI SKLADIŠTENJA I ROK TRAJANJA

Rok trajanja je 3 godine od datuma proizvodnje.

Čuvajte od izvora svjetlosti.

Skladištite na temperaturi (15-25°C).

Nakom prve upotrebe, ako se čuva u kartonskoj kutiji i u preporučenim uvjetima može se koristit u roku od 28 dana.

SIMPTOMI PREDOZIRANJA I MJERE OPREZA

Ponekad se kod prevelikih doza može pojaviti povraćanje, učinci poput ekstremnog umora, kada je tretiranje lijekom prekine-nestane spontano u kratkom vremenu.

MJERE OPREZA ZA ONE KOJI TRETIRAJU

U slučaju kontakta s kožom i očima, odmah isprati s puno vode. Uvijek operite ruke nakon primjene lijekova. Osobe osjetljive na Kinolon trebaju izbjegavati kontakt sa lijekom.

SPECIJALNA UPOZORENJA ZA NEUPOTRIJEBLJENE VETERINARSKE PROIZVODE ILI OTPADNI MATERIJAL

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa zakonski propisanom procedurom (Zakon o upravljanju otpadom – „Sl. Novine F BiH“ broj: 33/03):

PRIMJENA LIJEKA: Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“)

PAKOVANJE

Kutije sa staklenim bičicama od 20, 50 i 100 ml (flakon).

PROIZVOĐAČ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.San.A.Ş.

Çubuk yolu 2. km, Yenice Köyü Mevkii, Esenboğa /ANKARA

Tel: 03128271840

Datum odobrenja prospekta: 24.06.2004

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNIH POSLOVA REPUBLIKA TURSKA

BROJ I DATUM LICENCE: 13.03.2001-10/931

UVOZNIK ZA BiH

„Terravet“ doo Gradačac, Sarajevska bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 035/819-523

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP-I-06-2-20/21-435/21 J.B. od 07.05.2021.