



Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje

ID broj: 4254130240000

PDV broj: 254130240000

Tel./fax: +387 31/717-168

e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)

## CLOXALENE PLUS

### Intramamarna krema, za krave u toku laktacije

#### **SASTAV 5 ml (1 injektor)**

Ampicilin natrujum	200 mg (Ampicilina 188,20 mg)
Dicloxacilin natrijum	200 mg (Dicloxacilin 191,40 mg)
Nosač	do 5 ml

#### **ŽIVOTINJE NA KOJIMA SE UPOTREBLJAVA:**

Krave u laktaciji (akutni mastitisi).

#### **DJELOVANJE**

CloxaLEN plus je spoj polusintetskog pencilina Dicloxicilina (otpornog na enzim penicilazu) i ampicilina (osjetljivog na spomenuti enzim). Ovaj spoj dva antibiotika obezbjeđuje sinergiju djelovanja na inaktiviranje enzima penicilaze.

Dicloxacillin je vrlo djelotvoran na sve Gram + bakterije, a naročito na strafilokoke koji su proizvođači penicilaze.

Ampicilin djeluje na Gram – bakterije (E.coli, Salmonella sp., Pasterella sp. itd.)

Ovaj lijek se preporučuje u liječenju akutnih mastitisa (tokom laktacije), subakutnih i hroničnih. Apsorbira se brzo nakon aplikacije u količini od 80% u veoma kratkom roku, a samim tim i brzo djeluje na oboljeli dijelove parenhima mliječne žljezde kod krava u laktaciji. Eliminacija lijeka je putem mlijeka, a mali dio koji se absorbuje u drugim dijelovima organizma eliminiše se putem urina.

#### **INDIKACIJE**

Koristi se za liječenje akutnih, subakutnih i subkliničkih mastitisa kod krava tokom laktacije. Ukoliko je moguće, lijek upotrebljavati na osnovu antibiograma.

#### **KONTRAINDIKACIJE**

Ne koristiti kod životinja koje su osjetljive na ampiciline.

Ne koristiti zajedno sa bakteriostaticima.

#### **NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE**

Sadržaj injektora prije upotrebe dobro protesti. Prije upotrebe lijeka vime dobro oprati, izmusti, a vrh sise obavezno tretirati antiseptikom. Zatim se vrh injektora oprezno uvede u sisni kanal i kontinuiranim pritiskom sadržaja injektora aplicirati u mliječnu oboljelu četvrt. Nakon aplikacije lijeka obavezno izmasirati sisu od vrha prema bazi

kako bi se obezbjedilo bolje prodiranje lijeka u gornje dijelove mlijecne cisterne. U svaku četvrt oboljelog vimena aplicira se sadržaj jednog injektoru u razmaku od 12 sati i tako ponoviti minimum dva (2), a najviše četiri (4) puta.

Neodgovarajuće doziranje i korištenje lijeka može dovesti do prevage bakterije otpornih na penicilin.

### **PREDZIRANJE**

Nisu poznati simptomi kod životinja i kada se koriste veće doze nego što je propisano.

### **POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA PRIMJENU**

Ukoliko je moguće, ovaj lijek treba koristiti na osnovu rezultata antibiograma.

Neodgovarajuće korištenje proizvoda može dovesti do rezistencije bakterija na penicilin.

### **Posebne mjere predostrožnosti kod osoba koje daju proizvod životinjama**

Osobe koje su preosjetljive na penicilin moraju izbjegavati kontakt sa proizvodom.

### **NEGATIVNE REAKCIJE (učestalost i ozbiljnost)**

Životinjama koje su posebno osjetljive na penicilin lijek može izazvati alergijske reakcije. Ukoliko se uoče znaci alergije, liječenje prekinuti i primjeniti antialergijsku terapiju.

### **KORIŠTENJE TOKOM GRAVIDNOSTI, DOJENJA**

Može se koristiti tokom trudnoće i dojenja.

### **INTERAKCIJE SA OSTALIM VETERINARSKIM LIJEKOVIMA I DRUGI OBLICI INTERAKCIJE**

Polusintetički penicilini mogu biti spojeni sa aminoglikozidnim antibioticima. Ne koristiti zajedno baktericide i bakteriostatike.

### **KARENCA**

Meso i iznutrice: 2 dana

Mlijeko: 48 sati (4 mužnje)

### **NAČIN IZDAVANJA**

Na veterinaraski recept.

### **NAČIN ČUVANJA**

Čuvati na suhom, hladnom i tamnom mjestu.

### **ROK UPOTREBE**

2 godine

### **NAČIN PAKOVANJA**

Kutija od 4 injektora po 5 ml

Kutija od 12 injektora po 5 ml

Kutija od 60 injektora po 5 ml

**POSEBNE MJERE ZA ODLAGANJE LIJEKA I NJEGOVOG OSTATKA:**

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).

**BROJ I DATUM ODOBRENJA:**

UP-I-6-2-20/21-2534/20 J.B; od 14. aprila 2021. godine

**PROIZVOĐAČ:**

FATRO SPA, Via Emilia 285, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Italy

**DISTRIBUTER:**

SINTOFARM ADRIATICA d.o.o. Orašje, Poduzetnička zona Dusine br. 6, 76270 Orašje, BiH

Tel./fax: +387/31-717-168

e-mail: [info@sintofarm-adriatica.com](mailto:info@sintofarm-adriatica.com)

[www.sintofarm-adriatica.com](http://www.sintofarm-adriatica.com)