DEXATAT 2mg/ml

injekciona solucija
za upotrebu u veterinarstvu

DEXATAT 2mg/ml

Injekciona solucija
Deksametazon

Sastav:
1ml sadrži: Deksametazon natrij fosfat ..... 2.63 mg
(ekvivalent 2.00 mg deksametazona)

Indikacije:
Goveda: primarne ketoze i ketoze povezane sa lijevo dislociranim abomazusom.
Goveda, telad, konji, svinje, psi i mačke: alergije, kožne alergijske bolesti, akutni neinfektivni artritis, burzitis, tendovaginitis kao i svaki slučaj gdje su poželjni antiupalni učinci glukokortikoida.

Kontraindikacije:
Ne primjenjivati kod virusnih infekcija tokom faze viremije.
Ne primjenjivati kod životinja koje boluju od gastrointestinalnog ulcera.
Izuzev u hitnim situacijama ne primjenjivati kod životinja koje boluju od dijabetes melitusa, osteoporoze, hiperadrenokorticizma te srčanih i bubrežnih bolesti.
Ne primjenjivati intraartikularno gdje postoje znakovi fraktura, bakterijskih infekcija zglobova i aseptične koštane nekroze.
Lijek se ne daje životinjama u graviditetu.

Neželjene reakcije:
Antiinflamatorni kortikosteroidi kao što je deksametazon poznati su po tome što izazivaju širok spektar neželjenih dejstava. Dok se jednokratne visoke doze dobro tolerišu, u dugotrajnoj upotrebi one mogu izazvati različita neželjena dejstva i kada se daju estri koji posjeduju dugotrajno dejstvo. Srednje doziranje u dužem vremenskom periodu treba biti održavano na minimumu neophodnom za kontrolu simptoma. Steroidi tokom tretmana mogu uzrokovati jatrogeni hiperadrenokorticizam (Kušingova bolest) koja uključuje značajno nakupljanje masti, mišićnu slabost i raspadanje te osteoporozu. Tokom terapije učinkovite doze mogu uzrokovati hipotalamo-hipofizne-adrenokortikalne povratne sprege. Nakon prestanka terapije simptomi adrenalne insuficijencije mogu dovesti do adrenokortikalne atrofije što može dovesti do stanja da se životinja nije u stanju adrekvatno izboriti sa stresnim situacijama. Stoga bi se prethodno trebala razmotriti mogućnost smanjenja problema adrenalne insuficijencije koja nastaje nakon prestanka terapije, npr. doziranje koje koindicira sa vremenom najviše vrijednosti endogenih kortizona i postepenim smanjenjem doze.
Sistematska primjena kortikosteroida može uzrokovati poliuriju, polidipsiju i polifagiju, posebno tokom ranih faza terapije. Kod dugotrajne upotrebe neki kortikosteroidi mogu izazvati zadržavanje natrija i vode i hipokalemiju. Sistemski kortikosteroidi uzrokuju taloženje kalcijuma u koži (calicinosis cutis).
Kortikosteroidi mogu produžiti zarastanje rane a imunosupresivno djelovanje može oslabiti otpornost na ili pogoršati postojeće infekcije. Kod prisustva bakterijskih infekcija obično je potreban antibakterijski lijek kada se koriste steroidi. Kod virusnih infekcija steroidi mogu pogoršati ili ubrzati napredak bolesti.
Zabilježena je pojava gastrointestinalnog čira kod životinja liječenih kortikosteroidima i ona se može pogoršati steroidima kod životinja kojima se daju nesteroidni protuupalni lijekovi te kod životinja sa povredom kičmene moždine kojima se daju kortikosteroidi. Steroidi mogu uzrokovati uvećanje jetre (hepatomegaliju) sa povećanjem serumskih jetrenih enzima. Smanjen prag napada, latentna epilepsija , euforija, anksioznost kod mačaka, depresija ili agresivno ponašanje kod pasa.
U slučaju pojave ozbiljnih neželjenih reakcija ili nekih drugih neželjenih reakcija koje nisu naglašene na ovom uputstvu veterinar mora biti informiran i postupiti u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”br. 15/98 i 70/08)

Ciljane vrste:
Goveda, konji, svinje, psi i mačke

Doziranje za svaku vrstu, put i metod administracije:
Za intravenoznu, intramuskularnu i subkutanu primjenu.
Konji, goveda i svinje: 0.02- 0.06 mg deksametazona / kg tj. m. (1-3 ml Dexatat-a/100 kg tj.m)
Psi i mačke : 0.1- 0.25 mg mg deksametazona / kg tj. m. (0.05-0.125ml Dexatat-a /100 kg tj.m)
Za intraartikularnu promjenu:
Konji, goveda i svinje: 2- 10 mg deksametazona / artikularno (1-5 ml Dexatat-a artikularno)
Psi i mačke : 0.25- 5 mg deksametazona / artikularno(0.125-2.5 ml Dexatat-a artikularno)
Injekcionom davanju u zglobni prostor ili burzu bi trebalo prethoditi uklanjanje jednake količine sinovijalne tekućine. Neophodni su strogi aseptični uslovi .

Karenca:

Meso i iznutrice:	goveda	16 dana
	svinje	4 dana
	konji	16 dana
Mlijeko:	goveda	84 sata

Ne koristiti kod kobila čije se mlijeko koristi za ljudsku konzumaciju.

Specijalna upozorenja:

Specijalna upozorenja za korištenje kod životinja:

Kod prisustva bakterijske infekcije trebala bi se primjeniti odgovarajuća antibakterijska terapija.

Zabilježeno je da upotreba kortikosteroida kod konja izaziva laminitis. Zbog toga konje tretirane sa ovakvim preparatima trebalo bi posmatrati tokom trajanja perioda tretmana.

Specijalna upozorenja za osobe koje administriraju veterinarsko medicinski proizvod na životinjama:

U slučaju samo-ubrizgavanja , potražiti lječničku pomoć i pokažite uputstvo iz pakovanja ili naljepnicu proizvoda.

Gravidnost:

Korištenje nije preporučljivo tokom graviditeta.

Poznato je da je primjena u ranoj gravidnosti uzrok fetalnih abnormalnosti kod laboratorijskih životinja.

Administracija u kasnoj gravidnosti može dovesti do ranog porođaja ili abortusa i zaostajanja posteljice.

Laktacija:

Korištenje proizvoda kod mliječnih krava može uzrokovati smanjenje proizvodnje mlijeka.

Interakcije:

Primjena deksametazona može uzrokovati hipokalemiju te time povećati rizik toksičnosti od srčanih glikozida. Rizik od hipokalemije može biti izazvan ukoliko se deksametazon daje zajedno sa diureticima koji smanjuju kalijum.

Istovremena upotreba sa nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima može povećati pojavu gastrointestinalne ulceracije.

Glukokortikoidi imaju antagonistični efekat na inzulin. Istovremena upotreba sa enzimskim induktorima može smanjiti djelovanje deksametazona. Smanjeni imuni odgovor se može očekivati ako je tertman glukokortikoidima davan neposredno prije ili do 2 sedmice nakon aktivne imunizacije.

Kada se upotrebljava sa antiholinergicima povećava se intraokularni pritisak.

Djelovanje antikoagulanata može biti smanjeno. Supresija testnih kožnih reakcija.

Predoziranje:

Vidjeti dio „Neželjene reakcije“. Protuotrov nije poznat.

Inkompatibilnost:

Zbog nedostatka studije kompatibilnosti, ovaj proizvod ne treba mješati sa drugim veterinarsko medicinskim proizvodima.

Specijalna upozorenja za neupotrebljene veterinarske proizvode ili otpadni materijal:

Lijekove ne bi trebalo bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Svaki neiskorišteni veterinarski proizvod ili otpadni materijal treba biti uništen sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH br.33/03)

Ove mjere trebale bi pomoći u zaštiti okoliša

Specijalna upozorenja za čuvanje:

Držati izvan vida i dohvata djece.

Držati na temperaturi do 25°C.

Rok trajanja veterinarsko-medicinskog proizvoda pakovanog za prodaju: 3 godine

Jednom otvoreno, pakovanje treba iskoristiti unutar 28 dana.

Pakovanje:

Bočica od 50ml, 100ml; pakovanje 12x50ml, 12x100ml.

Moguće je da se sva pakovanja ne komercijalizuju.

Primjena lijeka:

Primjenu lijeka vrši doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar („Ad manum veterinarii“)

Proizvođač:

aniMedica Herstellungs GmbH , Im Sudfeld 9, 48309 Senden Bosensell, Njemačka

Industrial Veterinaria, S.A.: Esmeralda 19; 08950 Esplugues de Liobregat , Barcelona, Španija

Nosilac dozvole za stavljanje u promet :

aniMedica GmbH , Im Sudfeld 9, 48309 Senden Bosensell, Njemačka

Uvoznik za BiH:

Bosna Vet doo Zenica, Goraždanska 36a, 72000 Zenica

Broj i datum odobrenja: UP-I-06-2-20/21-60/21 J.B; od 04. 05. 2021. godine